

Мастієт® форте
(суспензія для інтрацистерального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста суспензія жовтувато-білого кольору зі специфічним запахом.

Склад

1 шприц-туба (8 г) містить діючі речовини:

тетрацикліну гідрохлорид	- 200 мг
неоміцину сульфат	- 250 мг
бацитрацин	- 2000 МО
преднізолон	- 10 мг.

Фармакологічні властивості

Тетрацикліну гідрохлорид – антибіотик широкого спектру дії, активний проти грамнегативних і грампозитивних мікроорганізмів. Бактеріостатично діє на *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, *E.coli*, *Klebsiella spp.*

Неоміцин – антибіотик, що належить до аміноглікозидної групи, бактерицидно діє на грампозитивні та грамнегативні бактерії (*Staphylococcus aureus*, *E.coli*, *Klebsiella spp.*, *A. pyogenes*, *Streptococcus spp.*).

Бацитрацин – бактерицидний антибіотик, який діє на грампозитивні та деякі грамнегативні бактерії (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *A.pyogenes*).

Преднізолон – кортикостероїдний гормон, який має протизапальну, протинабрякову дію.

Застосування

Для лікування корів під час лактації при клінічних та субклінічних маститах.

Дозування

Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену чверть молочної залози, яку попередньо видаюють і дезінфікують. Після введення препарату чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по всій цистерні. Процедуру повторюють тричі з інтервалом 12 годин.

Протипоказання

Препарат не застосовувати в сухостійний період. Не застосовувати тваринам, чутливим до неоміцину, тетрацикліну, бацитрацину.

Застереження

Споживання молока в їжу людям дозволяють не раніше як через 8 здоювань після закінчення курсу лікування. До зазначеного терміну молоко згодовують непродуктивним тваринам або утилізують.

Заборають забій тварин на м'ясо під час лікування. Споживання м'яса в їжу дозволяється через 14 діб після останнього введення препарату.

Форма випуску

Картонна коробка, яка містить 20 поліетиленових шприців-тубів по 8 г, упакованих в алюмінієвий пакет.

У картонну коробку додають серветки, зволожені миючим розчином на основі ізопропілового спирту і запаковані в окремий паперовий пакет.

Зберігання

Суше, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2° до 8°С.

Термін придатності – 24 місяці.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Інтервет СА
Рю Олівєр де Серрес
Андже технополе
49071 Бьюкузе цеде, Франція

Intervet SA
Rue Olivier de Serres
Angers technopole
49071 Beaucouze cedex, France

Виробник готового продукту:

Інтервет Інтернешнл Б.В.
Вім де Корверштраат, 35
5831 АН Боксmeer,
Королівство Нідерландів

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat, 35
5831 AN Boxmeer,
The Netherlands