

Додаток 2  
до реєстраційного посвідчення  
№ ВА-00132-02-14  
від 03.04.2014

### Листівка-вкладка

#### **Назва ветеринарного препарату**

Нобіліс® Гамборо 228Е, Nobilis® Gumboro 228Е - вакцина жива ліофілізована проти інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо) птиці.

#### **Склад**

1 доза вакцини містить штам 228Е  $\geq 2,0 \log_{10} \text{EID}_{50}$  живого вірусу бурсальної хвороби (хвороби Гамборо).

#### **Додаткові речовини:**

Стабілізатори (цукроза, альбумін сироватковий бика, натрію глютамат) та сліди гентаміцину.

#### **Фармацевтична форма**

Ліофілізат.

#### **Імунобіологічні властивості**

Перші антитіла будуть спостерігатися через тиждень після вакцинації.

#### **Вид тварин**

Курчата.

#### **Показання до застосування**

Активна імунізація курчат проти інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо).

#### **Протипоказання**

Немає.

#### **Застереження при застосуванні**

Мити та дезінфікувати руки і обладнання після вакцинації. Вакцинувати лише клінічно здорову птицю. Вміст флакону використати зразу після відкриття.

#### **Взаємодія з іншими засобами**

Не змішувати із іншими вакцинами чи препаратами.

#### **Особливі вказівки при несучості**

Не застосовують.

#### **Спосіб застосування та дози**

Вакцину застосовують через питну воду у кількості, яка відповідає віку птиці, але не більше ніж 40 л для 1000 доз вакцини, яку птиця повинна випити впродовж 2 годин. Термін та кількість вакцинацій залежить від рівня материнських антитіл, а також від виду курчат та способу вакцинації батьківського поголів'я.

#### **Програма вакцинації**

Бройлери - від батьківського поголів'я, яке було вакциноване лише живою вакциною проти хвороби Гамборо, вакцинують на 7-14 добу.

Бройлери - від батьківського поголів'я, яке було вакциноване інактивованою вакциною проти хвороби Гамборо, вакцинують на 14-17 добу.

Несучок - від батьківського поголів'я, яке було вакциноване лише живою вакциною проти хвороби Гамборо, вакцинують на 14-21 добу.

Несучок - від батьківського поголів'я, яке було вакциноване інактивованою вакциною проти хвороби Гамборо, вакцинують на 21-28 добу.

#### **Побічні ефекти**

Немає.

#### **Період виведення (каренції)**


Нуль днів.

#### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП**

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

#### **Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації**

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого



Продовження додатку 2  
до реєстраційного посвідчення  
№ ВА-00132-02-14  
від 03.04.2014

законодавства України (кип'ятять або спалюють).

**Термін придатності**

24 місяці. Відкритий флакон використати протягом 2-х годин після відкриття.

**Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморозувати.

Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

**Упаковка**

Флакони із гідролітичного скла (тип Ш), закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 1000, 2500, 5000, 10000 доз вакцини.

**Правила відпуску**

Без рецепту. Застосовувати препарат може лише лікар (фельдшер) ветеринарної медицини.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксmeer, Нідерланди.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.