

Загасити вогнище запалення



за допомогою
Фінадину!



MSD
Animal Health





Фінадин інгібує медіатори, які відповідають за запалення та шок...



Фінадин контролює продукцію тромбоксанів, простагланінів та простагландинів, що є основними медіаторами запалення та ендотоксичного шоку

Контроль тромбоксанів B2, 6-цета-простагландинів F1α та E2 після виниклого запалення та ендотоксичного шоку




Пікова концентрація медіаторів після експериментальної індукції запалення (внаслідок ін'єкції каррагіну) або шокowego стану (введення ендотоксинів) у корів контрольної групи, яким вводили стерильний фізіологічний розчин та тварин дослідних груп, яким вводили толфенамінову кислоту або Фінадин в якості терапевтичного засобу



... і контролює біль

Фінадин – високоефективний засіб для контролю больового синдрому, викликаного запаленням

Потужність знеболювальної дії була еквівалентна морфіну. Як показали результати досліджень з контролю больового синдрому, за потужністю знеболювальної дії Фінадин не поступався морфіну



Порівняльне дослідження знеболюючого ефекту Фінадину та морфіну (в/м 0,625 мг/кг) для контролю больового синдрому.




Фінадин бореться із запаленням та його наслідками...




Фінадин миттєво знімає симптоми запалення та допомагає підтримувати фізіологічні функції

Швидке зниження температури



Порівняння середньої температури тіла у 2-х груп, з респіраторними інфекціями та пролікованими антибіотиком, та однократною внутрішньовенною ін'єкцією Фінадину або мелоксикаму, відповідно до рекомендацій виробника

Збереження дихальної здатності




Порівняння через два дні, після лікування на предмет зменшення зрощення легеневої тканини у різних групах телят, інфікованих БРЗ; кожній окремій групі вводили: антибіотик + кетопрофен, антибіотик + карпрофен, антибіотик + Фінадин, відповідно до рекомендацій виробника



... і відновлює функції організму

Фінадин знижує економічні збитки від запалення та ендотоксикації

Найкращий приріст ваги навіть після респіраторної інфекції




Порівняння приросту ваги при використанні тільки антибіотика або антибіотика з Фінадином (курс лікування 3 дні) у тварин, які переохворіли на важку форму респіраторної інфекції

Більш швидке відновлення апетиту після хірургічної операції



Порівняння тварин із нормальним апетитом у % через 7 днів після хірургічної корекції зміщення сичуга у ВРХ, оброблених та необроблених Фінадином

Більше вироблення молока навіть після ендогенної інтоксикації



Порівняння молочної продуктивності через 24 години після введення Фінадину та фізіологічного розчину у корів, яким ввели ендотоксин E. coli

Фінадин

розчин для ін'єкцій

Опис. Прозорий безбарвний або жовтуватого кольору розчин.

Склад. 1 мл препарату містить діючу речовину: флуніксину меглумін 83,0 мг (еквівалентно 50,0 мг флуніксину). Допоміжні речовини: пропіленгліколь, діетаноламін, фенол, динатрію едетат, натрію формальдегідсульфоксидат, кислота хлористоводнева, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості. АТС-vet класифікаційний код: QM01AG90. Нестероїдні протизапальні і протиревматичні препарати. Флуніксин у формі меглумінової солі є нестероїдним протизапальним засобом, неселективним інгібітором циклооксигенази (ЦОГ1 і ЦОГ2), важливого ферменту циклу арахідонової кислоти. Впливаючи на процеси синтезу ейкозаноїдів, флуніксин знижує синтез тромбоксану та простагландинів E2, які мають провідну роль у розвитку ендотоксичного шоку. Зниження продукування медіаторів запалення зумовлює анагетичний, жарознижувальний та протизапальний ефекти флуніксину. Після внутрішньом'язового введення флуніксин швидко всмоктується і проникає в усі органи і тканини, максимальна концентрація в крові настає впродовж декількох хвилин. Незважаючи на короткий період напіввиведення (у середньому 2-8 годин), препарат кумулюється в місці заpalення, забезпечуючи терапевтичний ефект протягом 24 годин. Після внутрішньовенного введення клінічна дія препарату проявляється через 15-30 хв. Флуніксин на 99 % зв'язується з білками крові і виводиться переважно із каловими масами, решта – нирками.

Застосування. Застосовують як протизапальний, знеболювальний і жарознижувальний засіб для комплексного лікування великої рогатої худоби, коней і свиней при гострому перебігу запальних процесів і больовому синдромі. Для комплексного лікування свиней Фінадин застосовують при захворюваннях органів дихання і синдромі MMA (метрит-мастит-агалактия), для зниження больового синдрому у післяопераційний період (після кастрації). Для контролю запалення і больового синдрому коням препарат застосовують при захворюваннях опорно-рухового апарату, септичному ендотоксичному шоці, гострих запальних процесах травного каналу, кольках, після хірургічних втручань, як жарознижувальний засіб при бактерійних і вірусних інфекціях. Як допоміжний засіб лікування великої рогатої худоби при захворюваннях органів дихання (зокрема, емфіземи легенів), діареї, маститі, захворюваннях кінцівок, хворобах очей, ендотоксемії, патологічних станах, які супроводжуються гострим запальним процесом. Для зниження больового синдрому після обрізання рогів у телят.

Дозування. **Свиням** препарат вводять внутрішньом'язово у дозі: 2 мл препарату на 45 кг маси тіла один раз на добу впродовж трьох діб, за потреби, у комбінації з антибіотико- або регідраційною терапією. Максимальний об'єм одного введення не повинен перевищувати 5 мл. **Великій рогатій худобі** препарат вводять внутрішньовенно у дозі: 2 мл препарату на 45 кг маси тіла один раз на добу впродовж трьох діб, за потреби, у комбінації з антибіотико- або регідраційною терапією. При захворюваннях опорно-рухового апарату – 1 мл препарату на 45 кг маси тіла один раз на добу до 5 діб, що залежить від реакції на лікування. При кольках курс повторюють одно-двократно за виникнення рецидивів. При лікуванні коня за ендотоксемії або септичного шоку, на фоні завороту шлунку або інших станів порушення кровообігу травного каналу – вводять 0,2 мл препарату на 1 кг маси тіла кожні 6-8 годин.

Протипоказання. Не застосовувати тваринам із захворюваннями серця, печінки та нирок. Не застосовувати тваринам із ризиком кровотечі у травному каналі, за порушень гемостазу. Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату. Не застосовувати коровам протягом 48 годин до очікуваного отелення.

Побічна дія. Серед можливих побічних проявів – подразнення слизової оболонки травного каналу, утворення виразок. Можливе ураження нирок при застосуванні препарату тваринам у стані дегідратації та гіповолемії. Дуже рідко можливі атаксія або анафілактичний шок.

Особливі застереження при використанні. Лікування Фінадином проводять у комплексі з етіотропною терапією. Не перевищувати рекомендовані дози препарату.

Використання під час вагітності, лактації. Фінадин може застосовуватися протягом перших 36 годин після родів за умови моніторингу самок на предмет можливої затримки плаценти. Не застосовувати коровам протягом 48 годин до очікуваного отелення. Безпечність продукту у вагітних кобил і свиноматок, а також жеребців і кнурів-плідників не доведена. Рішення про застосування препарату приймає лікар ветеринарної медицини з огляду на співвідношення користь/ризик.

Взаємодія з іншими засобами. Не змішувати з іншими ветеринарними засобами. Не застосовувати одночасно з глюкокортикоїдами, іншими нестероїдними протизапальними препаратами та антикоагулянтами. Уникати одночасного застосування з нефротоксичними препаратами.

Період виведення (каренції). Велика рогата худоба: м'ясо і субпродукти – 4 доби, молоко – 24 години. Коні: м'ясо і субпродукти – 1 доба. Не застосовувати кобилам, молоко яких використовується у харчовій промисловості. Свині: м'ясо і субпродукти – 18 діб. До зазначеного терміну продукцію утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, відповідно до висновку лікаря ветеринарної медицини.

Застереження для осіб і обслуговуючого персоналу. При самоін'єкції препаратом необхідно звернутися за медичною допомогою. Після використання помити руки. При потрапленні препарату на шкіру та слизові оболонки необхідно змити його великою кількістю води, якщо виникло подразнення – звернутися за медичною допомогою. Зберігати слід у недоступному для дітей місці. Не допускати до роботи з препаратом осіб із гіперчутливістю до флуніксину.

Форма випуску. Розчин у флаконах зі скла I типу (за Європейською Фармакопеею), закритих корками зі хлорбутилової гуми і алюмінієвими ковпачками об'ємом 50, 100 і 250 мл, які вкладено у картонні пакки.

Зберігання. Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2° до 25 °С. Не заморожувати! Термін придатності – 36 місяців. Після першого відбору з флакону препарат необхідно використати впродовж 28 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Інтервет Інтернешнл Б.В.

Вім де Корверштраат, 35

5831 АН Боксmeer,

Королівство Нідерландів

Виробник готового продукту:

Шерінг-Плау Санте Анімаль; З.А. ЛА

Гріндольє 49500 Серге, Франція



Довіряй Фінадину

РПН® AA-05319-01-14

Представництво «Інтервет Ейдженсіс Б.В.» в Україні:

03680, Україна, м. Київ, вул. Амосова, 12, 3-й поверх БЦ "Горизонт Парк"

тел.: (044) 393-74-60, факс: (044) 393-74-91.

<http://www.merck-animal-health.com>