



# Nobivac® КС (Нобівак® КС)

## НОВА ЕРА ВАКЦИНАЦІЇ СОБАК ПРОТИ «КАШЛЮ РОЗПЛІДНИКІВ»

Усі наші домашні улюбленці досить допитливі та більшість з них дружелюбні. Яка собака відмовить собі у задоволенні обнюхатися з іншою собакою, що проходить поруч? Проте наслідки такого спілкування можуть бути небезпечними для здоров'я, особливо при контакті з великою кількістю тварин на виставках, тренувальних майданчиках, прогулянках, оскільки багато захворювань передаються повітряно-крапельним шляхом. Як же зробити дружбу наших улюбленців безпечною? Адже прикро позбавляти їх радості спілкування!

Одним із постійних ризиків для собак є «кашель розплідників» (або «вольєрний кашель», англ. назва: «kennel cough»).

Чим же небезпечно це підступне захворювання та що є причиною його виникнення?

Основна причина «кашлю розплідників» — вірус парагрипу собак (CPiV 2) у поєднанні з бактерією *Bordetella bronchiseptica*. При цьому *B. bronchiseptica* може поширюватись не тільки від однієї собаки до іншої, але і від котів до собак та навпаки, викликаючи захворювання. Інкубаційний період захворювання триває від 4–5 днів до двох тижнів, проте клінічні симптоми захворювання у більшості собак проявляються через 7–10 днів після зараження.

Типова ознака захворювання — глибокий гучний кашель, з раптовими нападами. У багатьох випадках кашель схожий на блювотні позиви. Якщо приєднується вторинна інфекція (бактерії та віруси), можливий більш важкий перебіг захворювання, навіть до розвитку пневмонії.

Найкращий метод попередження «кашлю розплідників» — профілактика за допомогою вакцинації. Найбільш сучасним та ефективним методом є інтраназальне щеплення вакциною Нобівак® КС виробництва компанії «MSD Animal Health» (Нідерланди).

Нобівак® КС захищає від парагрипу собак та *B. bronchiseptica* — збудників «кашлю розплідників».

Можливе одночасне застосування з іншими вакцинами серії Нобівак® (ЧГППі, Рабієс, Лепто) для повного захисту Вашого улюбленця.

Попросіть Вашого ветеринарного лікаря додати до вашої щорічної схеми, вакцинацію для захисту від «кашлю розплідників»

### Схеми щеплення собак вакцинами серії Нобівак®

	Основна вакцинація собак: ЧГППі (чума м'ясоїдних, аденовірусний гепатит, аденовірус дихальних шляхів, парвовірусний ентерит та парагрип (у вакцині ЧГППі))					+ Лептоспіроз	+ Кашель розплідників (парагрип + Bordetella Bronchiseptica)	+ Сказ
	● Паппі ЧП	● ЧГППі	● Лепто	● КС	● Рабієс			
4 – 6 тиж.	X			X				
8 – 9 тиж.		X	X					(X)
12 тиж.		X	X					X
1-й рік		X	X	X				X
2-й рік			X	X				X
3-й рік			X	X				X
4-й рік		X	X	X				X
5-й рік			X	X				X
6-й рік			X	X				X
7-й рік		X	X	X				X
8-й рік			X	X				X
9-й рік			X	X				X
10-й рік		X	X	X				X
11-й рік			X	X				X
12-й рік			X	X				X

(X) – можлива вакцинація у випадку неблагополучної епізоотичної ситуації, з обов'язковою ревакцинацією у 3 місячному віці