

18.12.2017

Бравекто спот-он
(краплі для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

флураланер - 280 мг.

Допоміжні речовини: диметилацетамід, глікофурол, диетилтолуамід, ацетон.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53BE01, флураланер)

Бравекто® спот-он – інсекто-акарицидний препарат системної дії. Діюча речовина флураланер – інсекто-акарицид групи ізоксазоліну, активна до кліщів (*Ixodes spp.*, *Dermatocentor spp.* та *Rhipicephalus sanguineus*) і бліх (*Ctenocephalides spp.*). Механізм дії флураланера полягає у блокуванні ГАМК-залежних і глутамат-залежних рецепторів членистоногих, що призводить до перебудження нейронів, порушення передачі нервових імпульсів, паралічу і загибелі.

Флураланер не викликає розвитку у тварин резистентності, що можливе при застосуванні інших інсекто-акарицидних сполук. Навіть при досить низьких концентраціях флураланер пригнічує функцію розмноження (яйцекладки) у бліх.

Після зовнішнього застосування флураланер всмоктується у шерсть, шкіру і підшкірну клітковину, звідки повільно потрапляє у гемациркулярне русло. Стабільний рівень концентрації флураланеру у плазмі крові собак спостерігають у період між 7 і 63 добою після застосування препарату, після чого він повільно знижується. У котів цей рівень спостерігають у період між 3 і 21 добою після застосування. Флураланер добре поширюється тканинами і досягає максимальної концентрації у жировій тканині і далі в печінці, м'язах і нирках. Пролонговане утримання, повільне виведення з плазми крові ($t_{1/2}$ =21 добу – у собак і $t_{1/2}$ =12 діб у котів) і відсутність екстенсивного метаболізму утримує ефективну концентрацію флураланера у період між застосуванням препарату. Флураланер виводиться переважно у незмінній формі екскрементами (до 90 % дози), виведення сечею незначне.

Застосування

Профілактика та лікування собак і котів при ураженні блохами і кліщами:

- блохи: *Ctenocephalides felis* і *Ctenocephalides canis*; препарат забезпечує тривалий інсектицидний захист (до 12 тижнів);

- кліщі (*Ixodes ricinus*, *Dermatocentor reticularis*, *Ixodes scapularis*, *I. hexagonus*, *Haemaphysalis elliptica*, *Rhipicephalus sanguineus*); препарат забезпечує тривалий ектопаразитицидний захист (до 12 тижнів).

Після обробки препаратом собак блохи (*Ctenocephalides felis*) гинуть через 8 годин після їх попадання на тіло хазяїна, кліщі – через 12 годин (*Ixodes ricinus*).

Після обробки препаратом котів блохи (*C. felis*) гинуть через 12 годин після їх попадання на тіло хазяїна, кліщі – протягом 48 годин (*I. ricinus*).

Бравекто® спот-он ефективно контролює популяцію бліх у середовищі утримання тварини.

Препарат застосовують у комплексній терапії блошиних алергічних дерматитів.

Препарат сприяє попередженню розповсюдження *Babesia canis*.

Дозування

Препарат застосовують одноразово крапельним нанесенням ("spot-on") на суху неушкоджену шкіру тварин.

Собаки

Препарат застосовують із розрахунку 25-56 мг флураланера/кг маси тіла тварини (див. табл.).

18.12.2017

Маса собак, кг	Необхідний розмір і кількість піпеток				
	112,5 мг	250 мг	500 мг	1000 мг	1400 мг
2-4,5	1				
> 4,5-10		1			
> 10-20			1		
> 20-40				1	
> 40-56					1

Для собак масою тіла понад 56 кг використовують необхідну комбінацію піпеток.

Коти

Препарат застосовують із розрахунку 40-94 мг флураланера/кг маси тіла тварини (див. табл.).

Маса кота, кг	Необхідний розмір і кількість піпеток		
	112,5 мг	250 мг	500 мг
1,2-2,8	1		
> 2,8-6,25		1	
> 6,25-12,5			1

Для котів масою тіла понад 12,5 кг використовують необхідну комбінацію піпеток.


Крок 1. Дістаньте піпетку з упакування. Відкриваючи, утримуйте піпетку вертикально (ковпачком догори) за основу або за тверду частину нижче ковпачка. Піпетку відкривають, обертаючи ковпачок на повний оберт за годинниковою або проти годинникової стрілки. Не намагайтесь відламати чи відокремити ковпачок! Він повинен залишатися на піпетці. Піпетка відкрита і готова до застосування після злому фіксатора, що буде відчуватися при повному обертанні ковпачка.



Крок 2. Тварина повинна стояти або бути у грудному лежачому положенні, з рівною спинною догори. Розгорніть шерстний покрив на спині між лопатками собаки (або поблизу основи черепа у котів), щоб було видно шкіру. Піднесіть кінчик піпетки до шкіри.

Крок 3. Обережно витисніть увесь вміст піпетки на шкіру. У великих собак вміст піпетки слід наносити у 2-4-х місцях вздовж хребта, для того щоб запобігти стіканню препарату.

У великих котів (масою більше 6,25 кг) вміст піпетки слід наносити у 2-х місцях, для того щоб запобігти стіканню препарату.



Перед обробкою препаратом необхідно встановити точну масу тіла тварини (зважування). Для оптимального контролю за еktopаразитами обробки проводять з інтервалами 12 тижнів.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із гіперчутливістю до компонентів препарату!

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати препарат собакам масою тіла менше 2 кг і котам віком до 11 тижнів і/або з масою тіла до 1,2 кг!

18.12.2017

Застереження

Після обробки тварин препаратом не допускати злизування препарату (одягають захисний комірць, намордник, фіксують щелепи допоміжними засобами) та утримувати їх подалі від відкритого вогню та нагрівальних приладів.

Не слід купати та занурювати у воду оброблених препаратом тварин протягом 3-х діб після обробки препаратом!

Для досягнення максимального захисту тварин, рекомендується періодично чистити і обробляти дозволеними засобами предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки, килими, м'які меблі тощо).

При роботі з препаратом Бравекто® спот-он дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

При обробці тварин препаратом Бравекто® спот-оп не можна курити, приймати їжу, пити.

Після використання препарату вимити руки водою з милом.

Після обробки тварин не гладити їх та не допускати контакту маленьких дітей з обробленими тваринами до повного висихання шерсті.

Особам із підвищеною чутливістю до флуранеру уникати контакту з препаратом.

При попаданні препарату в очі ретельно промити їх проточною водою. При випадковому заковтуванні препарату всередину необхідно негайно звернутися до лікаря та показати йому листівку-вкладку на препарат або етикетку.

Препарат є легкозаймистим, тому тварин обробляють подалі від відкритого вогню та нагрівальних приладів!

Форма випуску

Піпетки по 0,4; 0,89; 1,79; 3,57 або 5,0 мл, які запаковані у картонні коробки по 1 або 2 піпетки (в коробці можуть міститися лише піпетки однакової ємності). Піпетки упаковані в саше з алюмінієвої фольги.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей, місце при температурі до 30 °C. Не заморожувати.

Термін придатності

24 місяців. Після відкриття піпетки – використати увесь вміст одразу!

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В. (Королівство Нідерландів)

Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксmeer

Intervet International B.V. (The Netherlands)
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

Виробник готового продукту

Патхон Менюфекчурінг Сервісес ЛЛЦ
(Сполучені Штати Америки)
5900 Мартін Лютер Кінг Дж. Хайвей,
Грінвілл, ЕнСі, ЕнСі 27834

Patheon Manufacturing Services LLC (USA)
5900 Martin Luther King Jr. Highway,
Greenville, NC, NC 27834