

26.11.2019

**БутоксTM 7,5 Пур ОН
(сuspензія для зовнішнього застосування)**

Опис

Однорідна сусpenзія білого кольору.

Склад

100 мл препарату містять діючу речовину:
дельтаметрин- 0,75 г.

Допоміжні речовини: розчин формальдегіду (35 %).

Фармакологічні властивості

ATCvet: QP53, ектопаразити, інсектициди і репеленти (QP53AC11, дельтаметрин)

Діюча речовина препарату- дельтаметрин (група синтетичних піретроїдів) ефективно діє при безпосередньому контакті на кліщі, воші та мухи, які паразитують на шкірі тварин. При нанесенні на шкіру Бутокс 7,5 Пур Он швидко всмоктується, розподіляється по усій підшкірній клітковині і акумулюється у сальних залозах шкіри. Виділяючись на поверхню шкіри, захищає тварину від ектопаразитів.

При попаданні препарату на поверхню тіла ектопаразитів, а також у дихальні шляхи або через травну систему, дельтаметрин блокує нервову систему. Механізм дії дельтаметрину полягає в активації натрієвих каналів мембрани нервових клітин, незворотній деполяризації клітинних мембрани і блокаді нервової провідності, що призводить до паралічу і загибелі паразитів.

БутоксTM 7,5 Пур ОН є безпечним для домашніх тварин у рекомендованих дозах.

Застосування

Профілактика і лікування захворювань великої рогатої худоби і овець, спричинюваних ектопаразитами:

у великої рогатої худоби: кровосисні комахи (гедзі, комарі, мошки, москіти); кліщі-*Psoroptes bovis*, *Sarcoptes bovis*; воші - *Linognathus vituli* (у телят).

у овець: кліщі - *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes ovis*, воші - *Linognathus ovillus* і *L. pedalis*; рунець овечий - *Melophagus ovinus*.

Дозування


Застосовують лише зовнішньо, препарат наносять (поливають) вздовж хребта тварин від голови до хвоста у дозах:

Вид тварин, показання	Маса тіла тварин, кг	Дозування, мл/на тварину	Кратність обробки
Велика рогата худоба (включаючи телят) Захист від кровосисних комах	≤ 100 кг 100-300 кг ≥ 300 кг	10 20 30	Разова обробка забезпечує захист від кровосисних комах до 10 тижнів. Повторно тварин обробляють через 8-10 тижнів.
Велика рогата худоба (включаючи телят), вівці Сифункулятоз (воші)	≤ 500 кг ≥ 500 кг	10 20	Разова обробка. Овець обробляють після стрижки. Повторна обробка допускається через 8-10 тижнів.
Вівці Мелофагоз (рунець овечий)		10	Разова обробка. Усіх овець отарі обробляють після стрижки одночасно. Повторна обробка залежить від рівня ураження паразитами.

26.11.2019

Велика рогата худоба Арахнози (кліщі) (псороптоз, саркоптоз тощо)	15 мл/100 кг маси тіла; не більше 75 мл на одну тварину.	Разова обробка захищає тварин впродовж 4 - 5 тижнів.
--	--	--

Перед застосуванням флакон з препаратом добре збовтати.
Перед обробкою тварини необхідно:




- відкрутити ковпачок 2 над малим резервуаром і помістити на його місце пластикову насадку-дозатор, при цьому ковпачок 1 над основним резервуаром завжди повинен залишатися закритим;

- для наповнення малого резервуара необхідним об'ємом суспензії необхідно стиснути стінки контейнера. На малий резервуар нанесені мітки 5 і 10 мл;



- контейнер перевертають і за допомогою легких стискань його стінок обробляють шкірний покрив вздовж хребта необхідним об'ємом препарату;



- після закінчення обробки знімають насадку-дозатор і закручують знятий ковпачок на місце.

Протипоказання

Не застосовувати ослабленим і виснаженим тваринам.

Застереження

Після обробки забій тварин на м'ясо та споживання молока людьми дозволяється після останнього застосування препарату через:

- **велика рогата худоба** : до 30 мл препарату на тварину: м'ясо, субпродукти - 18 діб, молоко – без обмежень; до 75 мл препарату на тварину: м'ясо, субпродукти - 18 діб, молоко - 2,5 доби;

- **вівці**: м'ясо, субпродукти - 2 доби, молоко - 12 годин.

Усі роботи з препаратом БутоксTM 7,5 Пур ОН проводять з використанням спецодягу. Після закінчення роботи необхідно ретельно вимити обличчя і руки водою з мілом. При випадковому попаданні розчину на шкіру або слизові оболонки його необхідно змити струменем води або зняти тампоном; при попаданні всередину – випити склянку теплої води з 2-3 таблетками активованого вугілля та звернутися до лікаря, показавши листівку-вкладку або етикетку препарату.

Форма випуску

Поліетиленові флакони на 250 і 1000 мл з двома закручуваними ковпачками і дозаторами. Пляшки на 2500 мл з стопером. Для зручності обробки тварин в комплекті може надаватися пристрій-дозатор з пластиковою трубкою, пластиковою насадкою-перехідником і пасками для кріплення пляшки на спині лікаря, що проводить обробку тварин.

Зберігання

Зберігати препарат із застереженням (спісок Б) в упаковці виробника у сухому, захищенному від світла місці, у недоступному для дітей та тварин, окремо від напоїв і кормів для тварин, за температури не вище 25 °C.

Термін придатності

36 місяців.

Після першого відкриття – 30 тижнів.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Інтервєт Інтернешнл Б.В.
(Нідерланди)
Вім де Корверштраат, 35
5830 АН Боксмеер

Intervet International B.V.
(The Netherlands)
Wim de Korverstraat, 35
5830 AN Boxmeer

Виробник готового продукту

Інтервєт Продакшн С.А. (Франція)
Рю де Ліон, 27460, Іговіль

Intervet Productions S.A. (France)
Rue de Lyons, 27460, Igoville