

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® COR4+IB+ND+EDS, Nobilis® COR4+IB+ND+EDS - вакцина інактивована проти гемофільозу, інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості птиці.

#### Склад

Кожна доза (0,5 мл) вакцини містить:

Активні діючі речовини - інактивовані бактерії і віруси:

<i>A. paragallinarum</i>	
- штам 083 (серотип А)	$\geq 1 \text{ CPD}_{70}^*$
- штам Spross (серотип В)	$\geq 1 \text{ CPD}_{70}$
- штам Н-18 (серотип С)	$\geq 1 \text{ CPD}_{70}$
- штам 48 (серотип-варіант тип В)	$\geq 1 \text{ CPD}_{70}$
- вірус інфекційного бронхіту (IBV), штам М 41	індукує $\geq 2,0 \log_2$ одиниць РЗГА
- вірус синдрому зниження несучості (EDSV'76), штам ВС 14	індукує $\geq 3,2 \log_2$ одиниць РЗГА
- вірус ньюкаслської хвороби (NDV), штам Clone 30	індукує $\geq 4,0 \log_2$ одиниць РЗГА на 1/50-ту дози або $\geq 50 \text{ PD}_{50}^{**}$

\* 70%-вих курячих протективних доз; \*\* 50%-вих протективних доз

Допоміжні речовини: ад'ювант (рідкий парафін, полісорбат 80б сорбітану олеат).

Інактиванти: тіомерсал ( $\leq 0,02 \%$ ) і EDTA ( $\leq 0,07 \%$ ); формальдегід ( $\leq 0,5 \%$ ).

#### Фармацевтична форма

Емульсія.

#### Імунобіологічні властивості

Нобіліс® COR4+IB+ND+EDS забезпечує утворення активного специфічного імунітету проти гемофільозу птиці, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* серотипів А, В, С і серотип-варіантом типу В, а також інфекційного бронхіту типу Массачусетс, ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості'76.

#### Вид тварин

Кури.

#### Показання до застосування

Вакцина призначена для активної імунізації курей починаючи з 14-тижневого віку для захисту проти гемофільозу птиці, інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості'76. Захист триває щонайменше протягом одного періоду яйцекладки після вакцинації птиці.

#### Протипоказання

Вакцинувати лише здорових курей. Не застосовувати в період яйцекладки.

#### Застереження при застосуванні

Підігріти до температури 15-25°C. Перед використанням та протягом використання флакон з вакциною флакон періодично добре струшувати. Для вакцинації використовувати стерильні інструменти.

#### Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати з іншими препаратами.

#### Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати.

#### Спосіб застосування та дози

Кожній птиці необхідно ввести 0,5 мл вакцини підшкірно у нижню третину шиї.

#### Програма вакцинації

Нобіліс® COR4+IB+ND+EDS застосовують починаючи з 14-тижневого віку, але не пізніше, ніж за 4 тижні до початку яйцекладки.

Для забезпечення оптимального захисту птиці проти гемофільозу за 6 тижнів до вакцинації Нобіліс® COR4+IB+ND+EDS курей рекомендується вакцинувати вакциною Нобіліс® Corvac-4. Для забезпечення бустерного ефекту проти інфекційного бронхіту та ньюкаслської хвороби первинну вакцинацію птиці проводять живими вакцинами, а через 4 тижні після введення живої вакцини, проводять імунізацію птиці вакциною Нобіліс® COR4+IB+ND+EDS.

**Побічні ефекти**

Можливий незначний набряк у місці введення, який швидко зникає.

**Період виведення (каренції)**

Нуль днів

**Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП**

При випадковому введенні вакцини людині негайно зверніться до лікаря, повідомивши про те, що вакцина являє собою водно-олійну емульсію.

**Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації**

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

**Термін придатності**

24 місяці. Після відкриття флакону вакцину зберігають до трьох годин.

**Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати!

**Упаковка**

У картонній коробці по 1 або 12 флаконів з поліетилену терефталату на 500 або 1000 доз. Флакон закритий пробкою з нітрилової гуми та алюмінієвим ковпачком.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксmeer, Нідерланди.

**Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробників**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксmeer, Нідерланди.  
Мерк Шарп енд Дом Енімал Хелс, С.Л. СА, Полігоно Індустріал Ель Монтальво I, С/Депелін 6, Парсела 38, 37008 Карбахоса-де-ла-Саграда, Саламанка, Іспанія.

**Правила відпуску**

За рецептом.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.