

Фертагіл®
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий безбарвний розчин для ін'єкцій.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

гонадорелін – 0,1 мг.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт; натрію хлорид; вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

QHO1CA01 – гонадотропін-релізінг гормони

Гонадорелін – синтетичний аналог натурального гонадотропін-релізінг гормону, що виробляється гіпоталамусом. Дією на аденогіпофіз спричиняє виділення лютеїнізуючого (LH) та фолікулостимулюючого (FSH) гормонів, що викликає дозрівання фолікулів та овуляцію.

Після внутрішньом'язового введення коровам, швидко всмоктується з місця ін'єкції, період напівжиття у плазмі крові – близько 20 хв. Розподіляється переважно в епіфізі, долях гіпофізу, яєчниках, печінці та нирках. Швидко метаболізується у дрібні пептиди та амінокислоти. Виводиться переважно з сечею та респіраторно.

Застосування

Велика рогата худоба:

- кіста яєчників;
- профілактика затримки овуляції;
- профілактика післяродових патологій яєчників;
- покращення запліднення;

кролі:

- стимуляція овуляції.

Дози і способи введення тваринам різного віку

Внутрішньом'язово, одноразово у дозі:

велика рогата худоба:

кіста яєчників – 5 мл;

профілактика затримки овуляції в день штучного осіменіння – 1,0-2,0 мл;

профілактика післяродових патологій яєчників у перші сорок днів після отелення - 2,5 мл;

кролі:

для стимуляції овуляції через два дні після окоту вводять 0,2 мл препарату. Самку кроля запліднюють безпосередньо після введення препарату.

Протипоказання

Не застосовувати вагітним самкам з 14-ї доби після осіменіння.

Застосування під час вагітності, лактації

Фертагіл® може застосовуватися у період злучки/штучного осіменіння лактуючим і нелактуючим тваринам, а також самкам до 14-ї доби після осіменіння.

Застереження

Немає. Період каренції щодо м'яса та молока ВРХ – нуль днів; м'яса кролів – нуль днів.

Форма випуску

Скляні флакони по 5 мл, закупорені гумовими пробками з алюмінієвими ковпачками під обкатку.

Зберігання

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати. Термін придатності – 36 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!

1 0. 0 4. 2019

Власник реєстраційного посвідчення:

Інтервет Інтернешнл Б.В.
Вім де Корверштраат, 35
5831 АН Боксмеер,
Нідерланди

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat, 35
5831 AN Boxmeer,
The Netherlands

Виробник (виробники):

Інтервет Інтернешнл ГмбХ,
Фельдштрассе 1а,
85716 Унтершляйсхайм,
Німеччина

Intervet International GmbH,
Feldstrasse 1a,
85716 Unterschleissheim,
Germany