

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® Corvac-4, Nobilis® Corvac-4 - вакцина інактивована проти гемофільозу птиці.

#### Склад

Кожна доза (0,5 мл) вакцини містить:

Активні речовини - інактивовані бактерії:

<i>A. paragallinarum</i>	
- штамп 083 (серотип А)	$\geq 1 \text{ CPD}_{70}^*$
- штамп Spross (серотип В)	$\geq 1 \text{ CPD}_{70}$
- штамп Н-18 (серотип С)	$\geq 1 \text{ CPD}_{70}$
- штамп 48 (серотип-варіант тип В)	$\geq 1 \text{ CPD}_{70}$

\* 70% курячої протективної дози.

Допоміжні речовини: ад'ювант (рідкий парафін, полісорбат 80б, сорбітану олеат).

Інактиванти: тіомерсал ( $\leq 0,02\%$ ) і EDTA ( $\leq 0,07\%$ ).

#### Фармацевтична форма

Суспензія.

#### Імунобіологічні властивості

Нобіліс® Corvac-4 забезпечує утворення активного специфічного імунітету проти гемофільозу птиці, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* серотипів А, В, С і серотип-варіантом типу В. Захист триває до 49 тижнів після вакцинації.

#### Вид тварин

Кури.

#### Показання до застосування

Вакцина призначена для активної імунізації курей для захисту проти гемофільозу птиці.

#### Протипоказання

Вакцинувати лише здорових курей. Не застосовувати птиці в період яйцекладки.

#### Застереження при застосуванні

Підігріти до температури 15-25°C. Перед використанням та протягом використання флакон з вакциною флакон періодично добре струшувати. Для вакцинації використовувати стерильні інструменти.

#### Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати з іншими ветеринарними препаратами. Нобіліс® Corvac-4 може бути включений у схему вакцинації птиці разом з Нобіліс® IB+ND+EDS або Нобіліс® IB+ND.

#### Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати.

#### Спосіб застосування та дози

Кожній птиці необхідно ввести 0,5 мл вакцини підшкірно у нижню третину шиї.

Перед введенням флакон з вакциною струшують і доводять до кімнатної температури (15-25°C).

#### Програма вакцинації

Нобіліс® Corvac-4 застосовують починаючи з 3-тижневого віку, ревакцинують до початку яйцекладки, через 6 тижнів після першого щеплення птиці.

#### Побічні ефекти

У птиці можливе короткочасне (до 1 дня) зниження активності. Можливий незначний набряк у місці ін'єкції, який зникає протягом декількох тижнів.

#### Період виведення (каренції)

Нуль днів

#### Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

При випадковому введенні вакцини людині негайно зверніться до лікаря, показавши йому листівку-вкладку або упакування препарату.

**Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПІ, способи його знешкодження і утилізації**

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

**Термін придатності**

24 місяці. Після відкриття флакону вакцину зберігають до трьох годин.

**Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати!

**Упаковка**

У картонній коробці по 1 або 12 флаконів з поліетилену терефталату по 500 мл (1000 доз). Флакон закритий пробкою з нітрилової гуми та алюмінієвим ковпачком.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксmeer, Нідерланди.

**Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробника**

Мерк Шарп енд Дом Енімал Хелс, С.Л. СА, Полігоно Індустріал Ель Монтальво І, С/Цепелін 6, Парсела 38, 37008 Карбахоса-де-ла-Саграда, Саламанка, Іспанія.

**Правила відпуску**

За рецептом.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.