

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® ПАРАМІКСО<sub>P201</sub>, Nobilis® PARAMYXO<sub>P201</sub> – вакцина проти параміксовірусної інфекції голубів.

#### Склад

Кожна доза (0,25 см<sup>3</sup>) містить

Активної речовини:

параміксовірус голубів, штам P201

≥ 6,8 log<sub>2</sub> гемаглютинуючих одиниць в РЗГА.

Допоміжні речовини:

ад'ювант – рідкий парафін;

інактивант – формалін.

#### Фармацевтична форма

Емульсія.

#### Імунобіологічні властивості

Продукт стимулює розвиток активного імунітету проти параміксовірусної інфекції голубів, викликаної інфікуванням параміксовірусом 1 типу. Формування імунітету відбувається через чотири тижні після первинної вакцинації. Тривалість імунітету щонайменше 1 рік.

#### Вид тварин

Голуби.

#### Показання до застосування

Вакцина призначена для активної імунізації голубів з метою захисту проти клінічних проявів параміксовірусної інфекції, спричиненої інфікуванням параміксовірусом типу 1. У вакцинованих птахів виділення вірусу в навколишнє середовище при інфікуванні суттєво знижене.

#### Протипоказання

При застосуванні згідно листівки-вкладки відсутні.

#### Застереження при застосуванні

Вакцинувати лише здорових птахів.

#### Взаємодія з іншими засобами

Не відома.

#### Особливі вказівки під час несучості

Не вакцинувати протягом чотирьох тижнів від початку парувального сезону.

#### Спосіб застосування та дози

Кожному птахові в нижню дорсальну частину шиї підшкірно вводять по 0,25 см<sup>3</sup> вакцини.

Вакцинують голубів з 4-тижневого віку, за 6 тижнів до участі в змаганнях, виставках та парувального сезону. В подальшому вакцинацію проводять щорічно.

#### Побічні ефекти

Не спостерігаються.

#### Період виведення (каренції)

Нуль днів.

#### Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

При випадковому введенні людині негайно повідомити лікаря, показавши листівку-вкладку або упаковку препарату та проінформувати, що вакцина являє собою водно-олійна емульсія. У людини можливі локальні реакції по місцю ін'єкції вакцини.

#### Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

#### Термін придатності

24 місяці. Після відкриття флакону вакцину використати впродовж трьох годин.

**Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати.

**Упаковка**

Контейнер з поліетилену терефталату, закритий пробкою з нітрилової гуми та кодованим алюмінієвим ковпачком на 20 і 50 мл.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксmeer, Нідерланди.

**Правила відпуску**

Без рецепту.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.