

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® RT+IBmulti+ND+EDS, Nobilis® RT+IBmulti+ND+EDS – вакцина інактивована проти ринотрахеїту, інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та синдрому зниження несучості птиці.

#### Склад

Кожна доза (0,5 мл) вакцини містить

Активні діючі речовини (інактивовані віруси):

- |   |   |
|---|---|
| - вірус інфекційного бронхіту (IBV), штам М 41                  | $\geq 4,0 \log_2$ одиниць ВН;               |
| - вірус інфекційного бронхіту (IBV), штам 249g                  | $\geq 4,0 \log_2$ одиниць ВН;               |
| - вірус інфекційного ринотрахеїту індиків (TRT), штам But1#8544 | $\geq 9,5 \log_2$ ІФА одиниць;              |
| - вірус синдрому зниження несучості (EDS'76), штам BC14         | $\geq 6,5 \log_2$ одиниць РЗГА.             |
| - вірус ньюкаслської хвороби (NDV), штам Clone 30               | $\geq 50 \text{ PD}_{50}$ протективних доз; |

Допоміжні речовини:

ад'ювант – рідкий парафін

215 мг;

інактивант – формальдегід

$\leq 0,05 \%$ .

#### Фармацевтична форма

Емульсія.

#### Імунобіологічні властивості

Створення довготривалого імунітету проти інфекційного бронхіту типу Массачусетс та варіантних серотипів D 274/D207, ньюкаслської хвороби, синдрому зниження несучості та проти негативної дії інфекційного ринотрахеїту індиків. Тривалість імунітету після вакцинації у птиці утворюється на весь період яйцекладки, у випадку, якщо раніше птиця була вакцинована живими вакцинами проти інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та вірусного ринотрахеїту.

#### Вид тварин

Кури.

#### Показання до застосування

Вакцина призначена для активної імунізації несучок та батьківського поголів'я курей для захисту проти інфекційного бронхіту типу Массачусетс та варіантних серотипів D 274/D207, ньюкаслської хвороби, синдрому зниження несучості та проти негативної дії інфекційного ринотрахеїту.

#### Протипоказання

Вакцинувати лише здорових курей.

#### Застереження при застосуванні

Перед використанням флакон з вакциною струсити та довести до температури 15-25°C. Для вакцинації використовувати стерильні інструменти. Відкритий флакон використати протягом трьох годин.

#### Взаємодія з іншими засобами

Не використовувати одночасно з іншими препаратами.

#### Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати.

#### Спосіб застосування та дози

Кожній птиці необхідно ввести 0,5 мл вакцини внутрішньом'язово у грудний м'яз, стегно або підшкірно у нижню ділянку шиї.

#### Програма вакцинації

Нобіліс® RT+IBmulti+ND+EDS застосовують у віці 14-20 тижнів, але не пізніше, ніж за 4 тижні до початку яйцекладки.

Для оптимального підсилюючого (бустерного) ефекту птицю слід вакцинувати живою вакциною проти інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби та вірусного ринотрахеїту. Кращий результат можливий, якщо застосовувати інактивовану вакцину Нобіліс® RT+IBmulti+ND+EDS через 4 тижні

**Побічні ефекти**

Можливий незначний набряк у місці введення, який швидко минає.

**Період виведення (каренції)**

Нуль днів

**Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП**

При випадковому введенні вакцини людині негайно зверніться до лікаря, повідомивши про те, що вакцина являє собою водно-олійну емульсію.

**Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації**

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

**Термін придатності**

24 місяці. Після відкриття флакону вакцину зберігають до трьох годин.

**Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати!

**Упаковка**

Флакони зі скла типу II (за Європейською Фармакопеею) або з поліетилену терефталату на 500 або 1000 доз. Флакон закритий пробкою з нітрилової гуми та алюмінієвим ковпачком.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

**Назва та місцезнаходження виробників**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.  
Мерк Шарп енд Дом Енімал Хелс, С.Л. СА, Полігоно Індустріал Ель Монтальво І, С/Цепелін 6, Парсела 38, 37008 Карбахоса-де-ла-Саграда, Саламанка, Іспанія.

**Правила відпуску**

За рецептом.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.