

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® Рісмавак, Nobilis® Rismavac – вакцина жива проти хвороби Marek птиці.

Склад

Кожна доза вакцини (0,2 мл) містить:

живий вірус хвороби Marek, штам CVI 988 $\geq 3,0 \log_{10}$ TCID₅₀ в клітинно-асоційованій формі суспензованих клітин SPF курячих ембріональних фібробластів.

Вакцина також містить стабілізатори (сироватка теляти, диметилсульфоксид) та сліди антибіотиків.

Вакцина міститься в контейнері з рідким азотом.

Фармацевтична форма

Заморожена суспензія блідо-рожевого кольору.

Імунобіологічні властивості

Для стимуляції активного імунітету у курчат проти хвороби Marek, що виробляється протягом двох тижнів і зберігається протягом всього життя тварини.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для імунізації однодобових курчат проти хвороби Marek особливо у випадках високої вірулентності вірусу.

Протипоказання

Немас.

Застереження при застосуванні

Немас.

Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати з іншими вакцинами.

Особливі вказівки при несучості

Відсутнє.

Способ застосування та дози

Перед використанням потрібно простерилізувати обладнання шляхом кип'ятіння у воді протягом 20 хвилин або автоклавуванням (15 хвилин), не застосовувати хімічні дезінфектанти.

Розвести 1 ампулу з вакциною на 1000 доз у 200 мл стерильного розріджувача Nobilis Diluent CA на 1000 курчат (1 ампулу з вакциною на 2000 доз у 400 мл стерильного розріджувача Nobilis Diluent CA на 2000 курчат).

Перед тим як вийняти ампулу із вакциною з рідкого азоту, захистіть себе рукавичками, довгими рукавами, маскою та окулярами. Вийнявши ампулу, тримайте її подалі від обличчя та очей. Виймайте ампулу із рідкого азоту безпосередньо перед використанням. Рекомендовано працювати одночасно тільки з однією ампулою. Ампулу з вакциною розморожують, помістивши її у воду кімнатної температури. Не використовуйте гарячу або холодну воду. Після вийняття, висушіть ампулу та добре струсять. Пам'ятайте про те, що ампули можуть вибухнути при різкій зміні температури. Розламують ампулу в місці звуження. Вміст ампули обережно відбирають стерильним 5 см³ шприцом із голкою 1 мм. Голку одразу ж вводять у стопор флакона з розріджувачем й повільно частково заповнюють шприц розріджувачем.

Важливо: розріджувач у момент змішування повинен бути кімнатної температури (15-25) °C.

Вміст шприца обережно перемішують. Суспензію із шприца повільно вводять до флакону з розріджувачем при цьому сам флакон повільно збовтують. Набирають частину розріджувача в шприц, щоб змити ампулу; змивають ампулу та додають цей змив до загальної кількості вакцини (у розріджувач).

Одну дозу вакцини розводять 0,2 мл розріджувача Nobilis Diluent CA. Наповніть попередньо простерилізований автоматичний шприц, дотримуючись рекомендацій виробника та встановіть його на дозу в 0,2 мл. Проводьте вакцинацію.

Схема вакцинації:

1-денним курчатам – по 0,2 мл підшкірно у ділянку шиї або внутрішньом'язово у стегно.
Пляшечка із розведеною вакциною повинна зберігатись в холодній воді та періодично переміщуватись.

Весь вміст флакона потрібно використати протягом 2 годин після розведення, після 2-х годин залишки вакцини потрібно знищити шляхом кип'ятіння або спалювання.

Побічні ефекти

Немає.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами. Також необхідно дотримуватись правил роботи із рідким азотом та низькотемпературними матеріалами. Також потрібно пам'ятати про те, що ампули можуть вибухнути при різкій зміні температури, тому працівник повинен використовувати захисні рукавички та маску.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятітъ або спалюють).

Термін придатності

60 місяців в рідкому азоті. Після розведення використати протягом 2 годин, зберігаючи при температурі 2-8 °C.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати вакцину у рідкому азоті при температурі мінус 196 °C. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

Упаковка

Ампули із гідролітичного скла тип I з вакциною сусpenзією по 1000 доз та по 2000 доз у сосуді Дьюара з рідким азотом.

Правила відпуску

За рецептром. Застосовувати може лише лікар або фельдшер ветеринарної медицини.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервейт Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31,5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.