

## **Листівка-вкладка**

### **Назва ветеринарного препарату**

Нобіліс ІЛТ, Nobilis ILT – вакцина жива ліофілізована проти інфекційного ларинготрахеїту птиці.

### **Склад**

Кожна доза містить щонайменше  $2,5 \log_{10}$  EID<sub>50</sub> вірусу інфекційного ларинготрахеїту, штам Serva вирощеного на курячих ембріонах. Вакцина також містить стабілізатори (гліцин, казеїн оброблений панкреатином) та сліди гентаміцину, які використовувалися при виготовленні вакцини.

### **Фармацевтична форма**

Ліофілізат.

### **Імунобіологічні властивості**

Вакцина готується із спеціального штаму, модифікованого для кон'юктивального застосування з першої вакцинації. Вакцинація цим методом призводить до набуття імунітету в короткий строк, на 4-5 день після вакцинації. У разі вакцинації за вищеведеною схемою імунітет зберігається протягом року.

### **Вид тварин**

Кури.

### **Показання до застосування**

Застосовують для активної імунізації проти інфекційного ларинготрахеїту курей.

### **Протипоказання**

Немає.

### **Застереження при застосуванні**

Вакцинувати тільки здорову птицю.

### **Взаємодія з іншими засобами**

Не використовувати одночасно із вакцинами, що діють на респіраторний тракт. Інтервал між вакцинаціями повинен бути не менш ніж 14 днів.

### **Особливі вказівки при несучості**

Не рекомендується застосовувати під час несучості.

### **Спосіб застосування та дози**

Вводити одну дозу (одну краплю) на одну птицю інтраокулярно. Первінну вакцинацію проводять у віці 4-6 тижнів, ревакцинацію – у віці 14-16 тижнів.

### **Побічні ефекти**

Після вакцинації у деяких випадках спостерігається слабкий кон'юнктивіт, що самостійно проходить.

### **Період виведення (каренції)**

Нуль днів.

### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП**

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

### **Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації**

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятіть або спалюйте).

### **Термін придатності**

24 місяці. Після розведення використати протягом 2-х годин.

### **Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в темному місці при температурі від 2 °C до 8 °C. Після розчинення - при кімнатній температурі. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

### **Упаковка**

Флакони із гідролітичного скла (тип III), закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 500, 1000, 2500, 3000, 5000, або 10000 доз вакцини в картонних коробках по 1 або 10 флаконів. Коробка також може містити піпетки-аплікатори та пластикові перехідники для зручності приготування та застосування вакцини.

### **Правила відпуску**

За рецептром. Застосовувати препарат може лише лікар та фельдшер ветеринарної медицини.

### **Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35. П.О. Бокс 31, 5830 AA Боксmeer, Нідерланди.

### **Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення реклами щодо біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.