

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® МГ 6/85, Nobilis® MG 6/85 – вакцина жива ліофілізована проти мікоплазмозу птиці.

Склад

Кожна доза містить:

живий атенуйований штам MG 6/85 *Mycoplasma gallisepticum*, щонайменше 10^{6,9} КУО.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Використання живої вакцини із *Mycoplasma gallisepticum*, штам MG 6/85 призводить до активної імунізації та до зменшення клінічних проявів інфікування курчат епізоотичними штамми *Mycoplasma gallisepticum*.

Вид тварин

Кури (майбутня несучка).

Показання до застосування

Активна імунізація майбутньої несучки з метою зменшення клінічних проявів мікоплазменної інфекції птиці.

Протипоказання

Не вакцинувати хвору птицю.

Застереження при застосуванні

Вакцинують тільки здорову птицю.

Взаємодія з іншими засобами

Застосування антибактеріальних препаратів, особливо антимікоплазменної дії, за 5 діб до та 14 діб після вакцинації значно знижує ефективність вакцинації.

При використанні інших вакцин проти хвороб респіраторного тракту (ньюкаслської хвороби, бронхіту та ін.) за 14 діб до та 14 діб після щеплення вакциною проти мікоплазмозу, може призвести до ускладнень або зниження імунітету. У період за 14 діб до та 14 діб після щеплення курям може застосовуватися вакцина Nobilis MS® Live. Вакцину також можна застосовувати в комбінації з препаратом Nobilis® MS Live.

Немає даних про використання вакцини разом із іншими препаратами.

Особливі вказівки при несучості

Не застосовувати менш ніж за 4 тижні до початку періоду несучості або в період несучості.

Спосіб застосування та дози

Вакцину розчиняють у відповідному об'ємі води або розчинника для досягнення щонайменше 10^{6,9} КУО (1 доза) на птицю методом аерозоллю або шляхом закрапування в око.

Схема вакцинації

Вакцинують курчат, починаючи з 6-ти тижневого віку.

Після розчинення, вакцину використовують впродовж 2-х годин.

Спрей-метод

Приготування вакцини:

- 1) Вакцину розчиняють у чистій, прохолодній воді, що не містить хлору.
- 2) Флакон занурюють у воду і відкривають під водою.
- 3) Відділяють гумовий ковпачок і стопер від флакона.
- 4) Додають розчинену вакцину у воду для спрею (400 мл на 1000 птиць).
- 5) У випадку комбінованого застосування з вакциною Nobilis® MS Live повторюють етапи 2) і 3), розводячи вміст флакона Nobilis® MS Live того ж дозування, що й Nobilis® MG 6/85 у тій же воді.

Вакцинація

- 1) Вакцину суспензію розпилюють за допомогою аерозольного апарату (розмір крапель повинен бути не більше 20 мікрон).

- 2) Вакцинатор не повинен містити залишки дезінфектантів або знежиреного молока.
- 3) Використовуйте спреєр тільки для вакцинації. Після вакцинації спреєр потрібно добре промити.
- 4) Під час вакцинації закрийте повітропроводи та відключіть вентиляцію.
- 5) Слідуйте вказівкам щодо кількості води.

Закрапування в око

Приготування вакцини:

- 1) Відкривають флакони з вакциною і розчинником Oculo Nasal.
- 2) Сполучають флакони за допомогою конектора.
- 3) Збовтують обидва сполучені флакони до повного розчинення вакцини.
- 4) У випадку комбінованого застосування з вакциною Nobilis® MS Live, повторюють етапи 2) і 3), розводячи вміст флакона Nobilis® MS Live того ж дозування, що й Nobilis® MG 6/85 в тому ж розчиннику.
- 5) Відокремлюють менший флакон, переливають вміст у пластиковий флакон та приєднують піпетку для закрапування.

Вакцинація

- 1) Внесіть одну краплю в око кожній птиці.
- 2) Тримайте флакон з розчищеною вакциною перевернутим вертикально, щоб забезпечити постійний однаковий об'єм краплі.

Побічні ефекти

У здорової птиці системних клінічних реакцій на вакцинацію не спостерігається.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Запобігайте контакту із очима та шкірою. Використовуйте захисні окуляри та маски.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

Термін придатності

24 місяці. Відкритий флакон використати протягом 2 годин.

Умови зберігання і транспортування

В темному місці недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати.

Упаковка

Скляні флакони з гідролітичного типу I закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 500, 1000 та 2000 доз ліофілізованої вакцини.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксmeer, Нідерланди.

Правила відпуску

Без рецепту. Застосовувати препарат може лише лікар (фельдшер) ветеринарної медицини.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.