

Листівка-вкладка**Назва ветеринарного препарату**

Нобівак® Паппі ЧП, Nobivac® Puppy DP – вакцина жива полівалентна проти чуми та парвовірусу собак.

Склад

Одна доза вакцини містить:

живі віруси вирощені в культурі клітин:

чуми собак (CDV), штам Onderstepoort

$\geq 5,0 \log_{10} \text{TCID}_{50}$;

парвовірус (CPV), штам 154

$\geq 7,0 \log_{10} \text{TCID}_{50}$.

Вакцина може містити сліди антибіотиків.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Вакцина індукує вироблення антитіл в організмі імунізованих тварин проти чуми м'ясоїдних та парвовірусної інфекції собак.

Вид тварин

Собаки.

Показання до застосування

Для активної імунізації собак проти чуми і парвовірусної інфекції.

Протипоказання

Не вакцинувати хворих та ослаблених тварин.

Застереження при застосуванні

Практично встановлено, що рівень МА у цуценят із одного приплоду може суттєво відрізнитись, тому термін вакцинації не рекомендують визначати на основі серологічного дослідження суки.

Вакцинувати лише здорових цуценят. Перед використанням флакон із розчищеною вакциною довести до кімнатної температури та добре струсити. Використовувати стерильне обладнання, запобігати контакту вакцини із дезінфектантами або спиртом. Розчинену вакцину використати протягом 30 хвилин. Уникати контакту із потенційним джерелом інфекції протягом 14 днів після вакцинації.

Взаємодія з іншими засобами

Коли імунізація є частиною програми вакцинації, Nobivac® Lepto або Nobivac® L4 дозволяється використовувати для розчинення ліофілізату Nobivac® Puppy DP. Нема інформації по використанню одночасно з іншими вакцинами.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Вакцина може застосовуватися під час вагітності і лактації.

Спосіб застосування та дози

У стерильних умовах у флакон із вакциною Нобівак® Puppy DP за допомогою стерильного шприца вводять 1 мл розчинника Nobivac® Diluent і струшують. Після розчинення одну дозу вакцини вводять підшкірно, дотримуючись правил асептики і антисептики. Розчинену вакцину необхідно використати протягом 30 хвилин.

Дозволяється використовувати для розчинення ліофілізату Nobivac® Puppy DP наступні вакцини: Nobivac® Lepto або Nobivac® L4.

Програма вакцинації

У зв'язку із зниженням титрів материнських антитіл (МА) до рівня, що дозволяє уникнути інтерференції МА із вакциною, найоптимальніший вік для вакцинації проти чуми м'ясоїдних та парвовірусної інфекції становить 8-12 тижнів. В більшості випадків це є вік 6-9 тижнів, але для того, щоб гарантувати захист для окремих цуценят з дуже високим титром МА заключне щеплення

проти чуми та парвовірусної інфекції бажано робити у 12 тижнів.

Вік 4-6 тижнів - Nobivac® Puppy DP окремо.

Вік 8-9 тижнів - Nobivac® DHPPi із Nobivac® Lepto або Nobivac® L4

Вік 12 тижнів - Nobivac® DHPPi із Nobivac® Lepto або Nobivac® L4, Nobivac® Rabies, Nobivac® RL.

Ревакцинація.

Рекомендується, щоб собаки були ревакциновані проти:

1. Чуми м'ясоїдних, гепатиту, парвовірусної інфекції – кожні 2-3 роки.
2. Парагрипу собак, коронавірусної інфекції, лептоспірозу - кожен рік.
3. Сказу - кожні 3 роки (можлива щорічна ревакцинація в залежності від епізоотичної ситуації та вимог законодавства).

Побічні ефекти

У дуже рідких випадках можливий розвиток реакції гіперчутливості анафілактичного типу, як і при введенні інших чужорідних білків. У даному випадку рекомендують підшкірне введення розчину адреналіну.

Також можлива місцева реакція, у вигляді припухлості, що проходить самостійно протягом декількох днів після вакцинації.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат утилізують шляхом кип'ятіння або спалювання.

Термін придатності

В ліофілізованій формі: 24 місяці при температурі від 2 °С до 8 °С. Після розчинення – використати протягом 30 хвилин.

Умови зберігання і транспортування

В сухому темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

Упаковка

Флакони вакцини упаковані по 5, 10, 25, 50 штук у картонні коробки або пластикові коробки.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервет Інтернешпл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксmeer, Нідерланди.

Правила відпуску

Без рецепта.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.