

ПГ 600
(порошок з розчинником)
листівка-вкладка

Опис

Порошок білого кольору, який розчиняється у спеціальному розчиннику, що додається.

Склад

Одна доза містить:

Хоріонічний гонадотропін - 200 МО

сироваточний гонадотропін жеребих кобил (ГСЖК) - 400 МО

1 мл розчинника містить:

Динатрію гідрогенофосфат - 0,63 мг

Дигідрогенофосфат натрію - 0,66 мг

Вода для ін'єкцій - 998,71 мг.

Фармакологічні властивості

ATCvet QG03GA99.

Фармакологічна дія визначається наявністю у препараті гонадотропіну сироватки крові жеребих кобил (ГСЖК), який за властивостями подібний до фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та лютеїнізуючого гормону (ЛГ), та наявністю у препараті хоріонічного гонадотропіну (ХГ) подібного за властивостями до ЛГ.

Застосування

Тварини	Показання	Термін введення
Свиноматки	відновлення статевого циклу	0-2 доби після відлучення поросят
	збільшення кількості поросят у приплоді	0-2 доби після відлучення поросят
	відсутність статевої охоти	приблизно на 10-ту добу після відлучення поросят
	регуляція супоросності	протягом 80 діб після штучного осіменіння
	відсутність статевої охоти	у віці 8-10 місяців
Ремонтні свинки	індукція статевої охоти	тварини віком від 5,5-6,5 місяців та масою від 85 до 100 кг можуть бути запліднені у першу тічку після введення. Якщо осіменіння провести у другу тічку, то зростає ймовірність більшого приплоду.
	діагностика супоросності	протягом 80 днів після осіменіння, або штучного осіменіння.

Дозування

Після розчинення порошку у розчиннику, що додається, ПГ 600 вводиться у дозі 5 мл (400 МО ГСЖК та 200 МО ХГ) на 1 свиноматку, однократно, внутрішньом'язово у ділянку за вухом.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до ГСЖК.

При роботі з препаратом необхідно дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Порошок та розчинник у скляних флаконах із скла типу 2 (за Європейською Фармакопеею). Флакони з галогенобутиловим корком (за Європейською Фармакопеею) та алюмінієвим ковпачком упаковані в картонні коробки.

Об'єм флаконів: 5 та 25 мл.

03.03.2020

Термін придатності

3 роки. Після відкриття флакону – 24 години.

Зберігання

Препарат зберігати у сухому темному приміщенні в оригінальному упакованні при температурі від 2 до 8°C.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В.
Вім де Корверштраат, 35, 5831 АН
Боксмеер, Нідерланди

Intervet international B.V.
Wim de Korverstraat, 35, 5831 AN
Boxmeer, The Netherlands

Виробник (виробники)

Інтервет Інтернешнл Б.В.
Вім де Корверштраат, 35, 5831 АН
Боксмеер, Нідерланди

Intervet international B.V.
Wim de Korverstraat, 35, 5831 AN
Boxmeer, The Netherlands

Інтервет Інтернешнл ГмбХ,
Фельдштрассе 1а, 85716
Унтершляйсхайм, Німеччина

Intervet International GmbH,
Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim,
Germany