

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Паракокс 8, Parasox 8 – вакцина жива проти кокцидіозу курей.

Склад

Активні діючі речовини:

Кожна доза (0,1 мл) вакцини містить наступну кількість спорулярних ооцистів з 8 штамів кокцидій:

| | |
|------------------------------|--------------|
| <i>Eimeria acervulina</i> HP | 500 на дозу |
| <i>Eimeria brunetti</i> HP | 100 на дозу |
| <i>Eimeria maxima</i> CP | 200 на дозу |
| <i>Eimeria maxima</i> MFP | 100 на дозу |
| <i>Eimeria mitis</i> HP | 1000 на дозу |
| <i>Eimeria necatrix</i> HP | 500 на дозу |
| <i>Eimeria praesox</i> HP | 100 на дозу |
| <i>Eimeria tenella</i> HP | 500 на дозу |

Допоміжні речовини:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| стабілізатор (ксантанова камедь) | 0,0006 г на дозу |
| очищена вода | до 0,1 мл. |

Фармацевтична форма

Суспензія.

Імунобіологічні властивості

Вакцина забезпечує захист курчат проти семи видів патогенних кокцидій, а саме: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. praesox* і *E. tenella* через 10 днів після однократної вакцинації, що триває протягом 36 тижнів за умов утримання птиці в умовах, що дає змогу рециркуляції ооцист.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Застосовується для вакцинації клінічно здорових курчат проти семи видів патогенних для курчат кокцидій, а саме: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. praesox* і *E. tenella*.

Протипоказання

Не застосовувати хворій, ослабленій птиці та в стані стресу.

Застереження при застосуванні

Забезпечити птиці доступ до власних випорожнень, оскільки їх споживання забезпечує рециркуляцію ооцист і формування імунітету. Не застосовувати препаратів з антикокцидними властивостями протягом чотирьох перед і після вакцинації. Не застосовувати з вакциною інших, окрім кошенілі E120, барвників. Для уникнення інфікування польовими штамми до формування імунітету, поголів'я переводять, а пташники ретельно дезінфікують між циклами вирощування. Оскільки імунітет залежить від реплікації кокцидій у травному тракті птиці, через 1-3 тижні після вакцинації у випорожненнях курчат спостерігаються ооцисти вакцинних штамів кокцидій.

Корм, оббризканий вакциною Паракокс 8 не повинен містити антикокцидних агентів (перед і після вакцинації). Всі прилади для вакцинації повинні бути досконало очищені. Не застосовувати у сухі поїлки.

Взаємодія з іншими засобами

Корм і вода, заготовлені в будь-який період, перед або після вакцинації, не повинні містити протикокцидні агенти, включаючи сульфаніламідні і антибактеріальні препарати з протикокцидіозною дією. Наявність будь-якого чинника, який має протикокцидіозні властивості, може зменшити ефективність вакцинації.

Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози

Застосовують Паракокс 8 курчатам з 1-денного віку методами оббризкування корму, випоювання з водою або спреєм-методом з додаванням барвника кошеніль Е120.

Однократно вакцинують курчат з 1- до 9-денного віку (із розрахунку 0,1 мл нерозбавленої вакцини на птицю).

Перед застосуванням саше ретельно струшують, щоб забезпечити ресуспендування ооцист. Ксантанова камедь, що міститься у складі вакцини забезпечує краще суспендування вакцини.

Метод випоювання.

Вакцину вводять в дозі 0,1 мл на птицю, попередньо розчинивши її в 5,0 мл води. Для цього пакет з вакциною струшують на протязі 30 с для рівномірного розподілу ооцист. З допомогою автоматичного шприца та трубки, що додаються, вакцину повільно додають у воду поїлки у необхідній кількості і ретельно перемішують. Кількість доз вакцини визначається з розрахунку кількості поголів'я птиці. Для того щоб птиця відчула спрагу, поїння припиняють за 2 години до імунізації. Поїлки повинні бути чистими, без залишків кормів або дезінфектантів. Поїлок повинно бути на 30 % більше, щоб птиця випила розчинену вакцину за 1 годину.

Метод оббризкування вакциною корму

Вакцину рівномірно розбризкують по всій поверхні корму у вигляді крупних крапель, як в нерозбавленому вигляді, так і розбавлену в воді. Якщо вакцину розбавляють, то до одного об'єму вакцини додають не більше 4-х об'ємів води (до 5000 доз вакцини Паракокс 8 додають 2 л води). Резервуар для розподілення вакцини регулярно струшують, щоб не допустити осідання ооцист. Оббризкують корм, розподіливши його на чистому папері, ретельно перемішують в годівницях. Перед задаванням обробленого корму, птицю не годують протягом двох годин.

Спрей-метод

Вакцину розпилюють крупно-крапельним спреєм із розрахунку 21 мл розбавленої вакцинної суспензії на 100 голів птиці у спреї-кабінеті.

Об'єм суспензії, який розбризкується на 100 голів птиці, множать на 50, якщо потрібно обробити 5000 голів (в 500 мл саше міститься 5000 доз; в 100 мл – 1000 доз). Щоб отримати ресуспендовані ооцисти для крупно крапельного спрею, до вмісту саше, який містить 500 мл (100мл) вакцини додають 550 мл або 110 мл води. Для покращення контролю якості вакцинації рекомендовано застосовувати харчовий барвник кошеніль Е 120, який додають із розрахунку 0,1 % об'ємних.

Побічні ефекти

Відсутні.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Дотримуватись загальних правил роботи з ветеринарними засобами.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

Термін придатності

9 місяців. Розведену вакцину зберігають до трьох годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати.

Упаковка

Пластикові пакети об'ємом: 100 мл та 500 мл, що дорівнює 1000 та 5000 дозам вакцини. До вакцини додається шприц-автомат з силіконовою трубкою з спеціальною канюлею.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксmeer, Нідерланди.

Назва та місцезнаходження виробників

Інтервет ЮК Лтд/МСД Енімал Хелс, Уолтон Мейнор, Уолтон, Мілтон Кейнс, Бакінгемшир, МК7 7АДж, Великобританія.

Мерк Шарп енд Дом Енімал Хелс, С.Л. СА, Полігоно Індустріал Ель Монтальво І, С/Цепелін 6, Парсела 38, 37008 Карбахоса-де-ла-Саграда, Саламанка, Іспанія.

Правила відпуску

Без рецепту.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.