

**Регумат<sup>TM</sup>**  
**(розвчин для перорального застосування)**  
**листівка-вкладка**

**Опис**

Прозорий жовтуватий олійний розчин для перорального застосування.

**Склад**

1 мл препарату містить діючі речовини:

- альтреногест – 4 мг.

Допоміжні речовини:

- бутилгідроксианізол – 0,07 мг;
- бутилгідрокситолуол – 0,07 мг;
- олія соєва – до 1 мл.

**Фармакологічні властивості**

ATC vet класифікаційний код QG03DX90 – ветеринарні препарати на основі статевих гормонів, модулятори репродуктивної функції.

Механізм дії альтреногесту подібний до такої у прогестерону. Протягом курсу обробки тварин сполука діє за механізмом зворотного негативного зв'язку на гіпофізарний гонадотропін з метою інгібіції росту фолікулів і естральної поведінки. По завершенню обробки відбувається відновлення секреції гонадотропіну, що призводить до росту і дозрівання фолікулів. Однорідність розміру фолікулів в кінці курсі обробки поряд з синхронним відновленням секреції гонадотропіну у всіх ремонтних свинок і свиноматок призводить до синхронізованої тічки через 5-8 днів після завершення обробки.

Регумат<sup>TM</sup> застосовується для отримання однорідних груп самок з прогнозованою датою злучки і/або штучного осіменіння. Це полегшує введення молодих свинок в групи основних (лемінних) свиноматок, а також синхронізує перший еструс у свиней після відлучення поросят.

Максимальна концентрація в плазмі відзначається через 1 годину після першого введення і приблизно через 4 години після застосування останньої дози. Альтреногест швидко абсорбується в шлунково-кишковому тракті.

**Застосування**

Застосовується для синхронізації еструсу у ремонтних свинок з метою введення їх в групи основних (лемінних) свиноматок, а також синхронізує перший еструс у свиней після відлучення поросят.

**Дозування**

Перед застосуванням: видалити контролер з випускної трубки контейнера.

Встановити голівку щоб випускна трубка знаходилася над міткою і отримати першу дозу Регумату<sup>TM</sup> в 5 мл.

**Пауза між натисканнями голівки-дозатора – не менше 2 секунд.** При введенні препарату на корм перед кожною твариною, слід впевнитися, що тварини мають достатньо місця, щоб підійти до своєї порції у годівниці.

Ремонтні свинки: препарат вводять перорально в дозі 5 мл на 1 тварину з кормом протягом 18 днів 1р./день.

Свиноматки: перорально в дозі 5 мл на 1 тварину з кормом протягом 3 днів 1р./день.

**Протипоказання**

Регумат<sup>TM</sup> не застосовують свиням в період вагітності та лактації.

**Застереження**

Слід уважно визначати кількість обробок тварин. При груповому застосуванні слід упевнитися, що препарат вводився кожній свинці (свиноматці) в групі.

Забій на м'ясо дозволяється не раніше ніж через 9 діб після останнього введення.

Не струшувати контейнер перед застосуванням. Застосовувати з обережністю, в рукавичках та спецодязі. Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

При контакті препарату зі шкірою людини, необхідно ретельно промити місце контакту водою з милом. Не рекомендується працювати з препаратом вагітним жінкам та жінкам дітородного віку – випадкове споживання препарату може призвести до порушення менструального циклу або пролонгації вагітності.

У випадку випадкового вживання препарату людиною, необхідно одразу звернутися до лікаря, показавши йому упаковку або листівку-вкладку.

#### **Форма випуску**

Продукт може постачатися у контейнерах трьох типів:

1-й тип: циліндричний алюмінієвий контейнер – балон під тиском не менше 5,5 Бар, що створюється завдяки стисненому азоту. Загальна ємність контейнера – 600 мл, наповнення контейнера – 360 мл препарату. Дозатор, яким обладнано балон, дозволяє отримувати 5 мл (що відповідає 20 мг альтреногесту) препарату при одному натисненні.

2-й тип: алюмінієвий контейнер закупорений обтуратором, поєднаним з пластиковим кільцем і зовнішньою кришкою-ковпачком розміром 45 мм, що закручується. Загальна ємність контейнера – 625 мл, наповнення контейнера – 540 мл препарату.

Продукт постачається з мірним поліпропіленовим стаканом.

3-й тип: алюмінієвий контейнер ємністю 1 л закупорений обтуратором, поєднаним з пластиковим кільцем і зовнішньою кришкою-ковпачком розміром 45 мм, що закручується. Наповнення контейнера – 1 л препарату.

Продукт постачається з мірним поліпропіленовим стаканом.

#### **Термін придатності**

36 місяців. Після першого відкриття контейнера – зберігати 90 днів.

#### **Зберігання**

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2° до 25°C. Не допускати потрапляння прямих сонячних променів і нагрівання контейнера до 50°C.

#### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

#### **Власник реєстраційного посвідчення:**

Інтервett Інтернейшл Б.В.  
Вім де Корверштраат, 35  
5831 АН Боксmeer,  
Нідерланди

**Виробник (виробники):**  
Інтервett Продакшн С.А.  
Рю де Ліон  
27460, Іговілль  
Франція

Intervet International B.V.  
Wim de Korverstraat, 35  
5831 AN Boxmeer,  
The Netherlands

Intervet Production S.A.,  
Rue De Lyons  
27460, Igoville  
France