

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® ORT inac, Nobilis® ORT inac – вакцина інактивована проти орнітобактеріозу птиці.

Кожна доза (0,25 мл) вакцини містить

Активні речовини:

- інактивовані бактерії *Ornithobacterium rhinotracheale* серотипу А штаму В3263/91 $\geq 1 \times 10^7$ клітин.

Допоміжні речовини:

ад'ювант – рідкий парафін

107,2 мг;

інактивант – формальдегід

$\leq 0,05$ %.

Фармацевтична форма

Емульсія.

Імунобіологічні властивості

Створення активного імунітету проти орнітобактеріозу у племінного поголів'я бройлерів з метою зниження інтенсивності клінічних проявів захворювання та попередження вертикальної передачі *Ornithobacterium rhinotracheale* серотипу А.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для імунізації племінного поголів'я бройлерів з метою зниження інтенсивності клінічних проявів захворювання та попередження вертикальної передачі *Ornithobacterium rhinotracheale* серотипу А.

Протипоказання

Вакцинувати лише здорових курей.

Перед використанням флакон з вакциною струсити та довести до температури 15-25°C. Для вакцинації використовувати стерильні інструменти. Відкритий флакон використати протягом 10 годин.

Взаємодія з іншими засобами

Не використовувати одночасно з іншими препаратами.

Особливі вказівки під час несучості

Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози

Вакцинують птицю 6-12-тижневого віку з бустерною вакцинацією у віці 14-18 тижнів з інтервалом не менше 6 тижнів.

Кожній птиці необхідно ввести 0,25 мл вакцини підшкірно у нижню ділянку шиї або 0,25 мл вакцини внутрішньом'язово у грудний м'яз.

Побічні ефекти

Можливий незначний набряк у місці введення, який швидко минає.

Період виведення (каренції)

Нуль днів

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

При випадковому введенні вакцини людині негайно зверніться до лікаря, повідомивши про те, що вакцина являє собою водно-олійну емульсію.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

Термін придатності

24 місяці. Після відкриття флакону вміст використати протягом 10 годин

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00907-02-18
від 13.04.2021

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморозувати!

Упаковка

Флакони з поліетилену терефталату або зі скла типу I (за Європейською Фармакопеею) на 250 або 500 мл (на 1000 і 2000 доз відповідно). Флакон закритий пробкою з нітрилової гуми та алюмінієвим ковпачком. Флакони можуть пакуватися у картонні коробки.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксmeer, Нідерланди.

Правила відпуску

Без рецепта.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.