

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® РЕО+ІБ+Г+НХ, Nobilis® Reo+IB+G+ND – вакцина інактивована проти реовірусної інфекції, інфекційного бронхіту, хвороби Гамборо та ньюкаслської хвороби птиці.

Склад

Одна доза вакцини (0,5 мл) містить інактивовані віруси:

інфекційного бронхіту, штам M41	$\geq 6,0 \log_2$ гемаглютинуючих одиниць;
ニュкаслської хвороби, штам ND Clone30	≥ 50 протективних доз PD ₅₀ ;
інфекційної бурсальної хвороби, штам D78	$\geq 14,5 \log_2$ ВНО;
штами реовірусу 1733 та 2408	$\geq 7,4 \log_2$ ELISA одиниць.

Фармацевтична форма

Емульсія.

Імунобіологічні властивості

Розчинення антигену у водно-олійній емульсії забезпечує пролонговану стимуляцію імунітету. При правильному проведенні першої вакцинації та ревакцинації у курей індукується утворення специфічних антитіл на рівні, достатньому для їх захисту від ньюкаслської хвороби та попередження зниження продуктивності, пов'язаної з інфекцією викликаної вірусом інфекційного бронхіту (серотип Массачусетс).

В умовах птахівницьких господарств потомство вакцинованої птиці, отримане на будь-якій стадії періоду яйцепладки, має достатньо високий рівень материнських антитіл, щоб захистити його від реовірусної інфекції та хвороби Гамборо в перші тижні життя.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Рекомендується використовувати вакцину для ревакцинації батьківського поголів'я курей з метою їх захисту від ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей (серотип Массачусетс), а також для імунізації птиці проти реовірусної інфекції та вірусу інфекційної бурсальної хвороби, що дозволяє захистити їх майбутнє потомство у перші тижні життя від викликаних цими агентами захворювань за рахунок високого титру материнських антитіл. Вакцина Нобіліс® РЕО+ІБ+Г+НХ, що містить один серотип (Массачусетс) вірусу інфекційного бронхіту курей, може використовуватися для імунізації птиці тільки у районах, в яких відсутня циркуляція інших серотипів збудника. В тих же районах, де циркулюють інші серотипи вірусу інфекційного бронхіту курей, слід використовувати відповідні (гомологічні їм) вакцини Nobilis.

Протипоказання

Немає.

Застереження при застосуванні

Вакцинувати лише здорову птицю. Використовувати стерильне обладнання, запобігати контакту вакцини із дезінфектантами або спиртом. Перед використанням довести температуру вакцини до (15-25) °C, флакон із вакциною добре струсити. Після відкриття вакцину використати протягом 3 годин.

Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати з іншими вакцинами чи препаратами.

Особливі вказівки при несучості

Не застосовується.

Спосіб застосування та дози

Вакцину вводять кожній окремій птиці внутрішньом'язово (в стегновий або грудний м'яз) чи підшкірно у нижню частину шиї у дозі 0,5 мл.

Програма вакцинації

Вакциною Нобіліс® РЕО+ІБ+Г+НХ вакцинують птицю, що досягла віку 16-20 тижнів;

допускається проведення імунізації птиці не менше, ніж за 4 тижні до початку періоду яйцепладки. Для отримання максимальної імунної відповіді на ревакцинацію, попередньо необхідно вакцинувати птицю живими вакцинами проти інфекційного бронхіту, ньюкаслської хвороби, реовірусної інфекції та інфекційної бурсальної хвороби.

Кращі результати можна отримати у випадку, коли імунізація інактивованою вакциною проводиться через 6 чи більше тижнів після першої імунізації живими вакцинами. За жодних умов птицю не можна ревакцинувати раніше, ніж за 4 тижні після першої вакцинації.

Побічні ефекти

У здорової птиці системних клінічних реакцій на вакцинацію не спостерігається. Можуть спостерігатися місцеві тканинні реакції – протягом декількох тижнів після вакцинації можливе зберігання невеликої припухlostі у місці ін'єкції препаратом.

Період виведення

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Якщо людина, що вакцинує випадково ін'єктує себе або напарника, може з'явитись локальна реакція в місці уколу. В цьому випадку рекомендується звернутися до лікаря, проінформувавши його, що вакцина є олійною емульсією.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат утилізують шляхом кип'ятіння або спалювання.

Термін придатності

24 місяці. Після відкриття вакцину використати протягом 3 годин.

Умови зберігання і транспортування

В сухому темному місці недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати.

Упаковка

Флакони по 500 мл (1000 доз).

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксмеер, Нідерланди.

Назва та місцезнаходження виробників

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксмеер, Нідерланди.

Мерк Шарп енд Дом Енімал Хелс, С.Л. СА, Полігоно Індустріал Ель Монтальво I, С/Цепелін 6, Парсела 38, 37008 Карбахоса-де-ла-Саграда, Саламанка, Іспанія.

Правила відпуску

За рецептом. Застосовувати препарат може лише лікар або фельдшер ветеринарної медицини.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред'явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.