

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® Рісмавак+СА 126, Nobilis® Rismavac+CA 126 – вакцина жива комбінована проти хвороби Марека птиці.

Склад

Одна доза вакцини (0,2 мл) містить:

вірус хвороби Марека, штам CVI-988	$\geq 3,0 \log_{10}$ PFU;
вірус хвороби Марека, штам FC-126	$\geq 3,0 \log_{10}$ PFU.

Вакцина міститься в контейнері з рідким азотом.

Фармацевтична форма

Вакцина - клітинна суспензія вірусу хвороби Марека та SPF курячих ембріональних фіробластів, заморожена у рідкому азоті.

Імунобіологічні властивості

Для стимуляції активного імунітету у птиці проти хвороби Марека, який здатний захистити птицю протягом всього продуктивного періоду.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для імунізації однодобових курчат проти хвороби Марека особливо у випадках високої вірулентності вірусу.

Протипоказання

Немає.

Застереження при застосуванні

Зберігати у рідкому азоті до безпосереднього використання. Не використовувати вакцину, що була розморожена заздалегідь перед використанням. Необхідно запобігати розповсюдженню вакцини після відкриття флакону.

Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати з іншими вакцинами.

Особливі вказівки при несучості

Відсутні.

Спосіб застосування та дози

Перед використанням потрібно простерилізувати обладнання шляхом кип'ятіння у воді протягом 20 хвилин або автоклавуванням (15 хвилин при 121 °C), не застосовувати хімічні дезінфектанти.

Розчинити 1 ампулу з вакциною на 1000 доз у 200 мл; 2000 доз – у 400 мл стерильного розріджувача Nobilis Diluent CA.

Перед тим як вийняти ампулу із вакциною з рідкого азоту, захистіть себе рукавичками, довгими рукавами, маскою та окулярами. Вийнявши ампулу тримайте її подалі від обличчя та очей. Виймайте ампулу із рідкого азоту безпосередньо перед використанням. Рекомендовано працювати одночасно тільки з однією ампулою. Ампулу розморожують помістивши її у воду кімнатної температури (20-25) °C. Не використовуйте гарячу або холоду крижану воду. Вийняту ампулу висушіть та добре струсіть. УВАГА! Пам'ятайте про те, що ампули можуть вибухнути при різкій зміні температури.

Розламують ампулу в місці звуження. Вміст ампули обережно відбирають стерильним 5 мл шприцом із голкою 1 мм. Голку одразу ж вводять у стопор флакона з розріджувачем і повільно частково заповнюють шприц розчинником.

Важливо: розріджувач у момент змішування повинен бути кімнатної температури (15-25) °C. Вміст шприца обережно перемішують. Розчин із шприца повільно вводять до флакону з розріджувачем, при цьому сам флакон повільно збовтують. Набирають частину розріджувача в шприц, щоб зmitи

ампулу, змивають ампулу та додають цей змив до загальної кількості вакцини (у розріджувач). Одну дозу вакцини розчиняють 0,2 мл розріджувача Nobilis Diluent CA.

Наповніть попередньо простерилізований автоматичний шприц дотримуючись рекомендацій виробника та встановіть його на дозу 0,2 мл. Проводьте вакцинацію.

Метод вакцинації

1-денним курчатам вакцину по 0,2 мл уводять підшкірно у ділянку шиї або внутрішньом'язово у стегно.

Пляшечка із розрідженою вакциною повинна зберігатись в холодній воді та періодично переміщуватись.

Весь вміст флакона потрібно використати протягом 2 годин після розрідження, після 2-х годин залишки вакцини потрібно знищити шляхом кип'ятіння або спалювання.

Побічні ефекти

Немає.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами. Також необхідно дотримуватись правил роботи із рідким азотом та низькотемпературними матеріалами. Потрібно пам'ятати про те, що ампули можуть вибухнути при різкій зміні температури, тому працівник повинен використовувати захисні рукавички та маску.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятити або спалювати).

Термін придатності

48 місяців в рідкому азоті. Після розчинення використати протягом 2 годин, зберігаючи при температурі 2-8°C.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати вакцину у рідкому азоті при температурі мінус 196 °C. Контейнер із рідким азотом зберігати у вертикальному положенні в сухому вентильованому приміщенні, окремо від інкубатора та кліток із птицею. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

Упаковка

Ампули із гідролітичного скла тип I з вакциною суспензією по 1000 або 2000 доз у сосуді Дьюара з рідким азотом.

Правила відпуску

За рецептром. Застосовувати може лише лікар або фельдшер ветеринарної медицини.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервет Інтернейшнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31,5830 АА Боксмер, Нідерланди.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення reklamaцій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.