

## Листівка-вкладка

### **Назва ветеринарного препарату**

Нобіліс® НХ С2, Nobilis® ND C2 – вакцина жива проти ньюкаслської хвороби птиці.

### **Склад**

Кожна доза містить мінімум  $5,7 \log_{10}$  ЕІД<sub>50</sub> живого атенуїованого вірусу ньюкаслської хвороби, штам С2, який є клоном штаму Hitchner B1, що культивується на SPF ембріонах курей, з додаванням стабілізуючого середовища. Вакцина містить стабілізатори (сорбітол, гідролізований желатин, казеїн оброблений панкреатином) та сліди гентаміцину.

### **Фармацевтична форма**

Ліофілізат.

### **Імунообіологічні властивості**

Для стимуляції активного імунітету проти ньюкаслської хвороби у курей. Імунітет індукується протягом 14 діб і може тривати до 42 днів після вакцинації. Для набуття повного адекватного імунітету, необхідно умовою є ревакцинація через 2-3 тижні вакциною Нобіліс® НХ Клон30.

### **Вид тварин**

Кури.

### **Показання до застосування**

Застосовують для імунізації курчат з метою зменшення клінічного прояву і смертності, викликаних вірусом ньюкаслської хвороби.

### **Протипоказання**

Не встановлені.

### **Застереження при застосуванні**

Вакцинувати лише здорову птицю. Мити та дезінфікувати руки та обладнання після вакцинації. Максимально уникати потрапляння вакцини в очі, на шкіру та одяг, при необхідності, використовувати індивідуальні засоби захисту – окуляри, маску, гумові рукавиці, халат .

### **Взаємодія з іншими засобами**

Невідома.

### **Особливі вказівки при несущості**

Немає.

### **Способ застосування та дози**

Вакцину вводять інTRANАЗАЛЬНИМ/інTRAOKУЛЯРНИМ або спрей-методом. Оптимальний час і метод введення залежить від місцевих умов. Через м'якість штаму С2, він зручний для вакцинації курчат з одноденного віку інTRANАЗАЛЬНИМ/інTRAOKУЛЯРНИМ та спрей-методом, після чого рекомендується ревакцинувати через 2-3 тижні Нобіліс® НХ Клон30 для підсилення імунітету. Застосовувати в дозі  $5,7 \log_{10}$  ЕІД<sub>50</sub> на птицю.

### **Спрей-метод**

Вакцину розчиняють у дистильованій чи чистій питній воді без домішок заліза та хлору. До води можна додавати 2% знежиреного молока. Наприклад: для імунізації 1000 голів однодобових курчат, 1000 доз вакцини розчиняють у 0,25 л води, а для птиці іншого віку – у 0,5 л води.

Для розпилювання вакцини використовують спеціальні генератори, які забезпечують утворення крапель діаметром 130-185 мкм (крупнокрапельний спрей). Розпиловач повинен бути корозійностійким і не містити залишків дезінфектантів. Під час вакцинації спрей-методом відключають систему вентиляції та опалення, закривають вентиляційні отвори, знижують рівень освітлення. Розчинена вакцина повинна рівномірно розприскуватися на відповідну кількість птиці з відстані 30-40 см. Перевіркою правильно проведеної імунізації буде служити трохи змочене пір'я птиці. Через 15 хвилин після закінчення вакцинації слід увімкнути систему вентиляції та опалення, відновити рівень освітлення. Допускається застосування вакцини в інкубаторі.

### **Інтраназальний/інтраокулярний метод**

Розчинити вакцину із розрахунку: 1000 доз у 30 мл дистильованої чи чистої питної води без домішок хлору та заліза. Розчинену вакцину закапують піпеткою в ніздрю у об'ємі 0,03 мл (1 крапля), іншу при цьому закривають пальцем, що забезпечує глибоке проникнення вакцини у носову порожнину. У випадку закупорення носової щілини, вакцину у тому ж об'ємі наносять на кон'юктиву ока.

### **Побічні ефекти**

Немає.

### **Період виведення (каренції)**

Нуль днів.

### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП**

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами. Максимально уникати потрапляння вакцини в очі, на шкіру та одяг, при необхідності, використовувати індивідуальні засоби захисту – окуляри, маску, гумові рукавиці та халат.

### **Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації**

Невикористаний і протермінований препарат утилізують шляхом кип'ятіння або спалювання.

### **Термін придатності**

Ліофілізована маса: – 24 місяці. Після розчинення використати протягом 3-х годин.

### **Умови зберігання**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 °C до 8 °C. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

### **Упаковка**

Флакони із гідролітичного скла (тип II), закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 500,1000, 2000,2500, 5000, 10000 та 25000 доз вакцини, упаковані в картонні коробки по 1 або 10 флаконів.

### **Правила відпуску**

За рецептом. Застосовувати препарат може лише лікар (фельдшер) ветеринарної медицини.

### **Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення**

Інтервет Інтернешнл Б.В. Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31,5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

### **Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробників**

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

Мерк Шарп енд Дом Енімал Хелс, С.Л. СА, Полігоно Індустріал Ель Монтальво I, С/Цепелін 6, Парсела 38, 37008 Карбахоса-де-ла-Саграда, Саламанка, Іспанія.

### **Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виники ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред'явлення reklamaцій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.