

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Порциліс® Ері+Парво+Лепто, Porcilis® Ery+Parvo+Lepto – вакцина інактивована проти бешихи, парвовірозу і лептоспірозу свиней.

#### Склад

Кожна доза вакцини (2 мл) містить:

- антиген *Erysipelothrix rhusiopathiae*, штам M2, серотип 2 >1 PPD (захисна доза 1 свині);
- парвовірус свиней, штам 014, вирощений на тканинній культурі  $\geq 130$  МО в ІФА;
- *Leptospira interrogans* серогрупи Canicola серовару Portland-Vere (штам Ca-12-000)  $\geq 2816$  МО в ІФА;
- *L. interrogans* серогрупи Icterohaemorrhagiae серовару Copenhageni (штам Ic-02-001)  $\geq 210$  МО в ІФА;
- *L. interrogans* серогрупи Australis серовару Bratislava (штам As-05-073)  $\geq 1310$  МО в ІФА;
- *L. kirschneri* серогрупи Grippotyphosa серовару Dadas (штам Gr-01-005)  $\geq 648$  МО в ІФА;
- *L. interrogans* серогрупи Pomona серовару Pomona (штам Po-01-000)  $\geq 166$  МО в ІФА;
- *L. santarosai* серогрупи Tarassovi серовару Gatuni (штам S1148/02)  $\geq 276$  МО в ІФА.

Антигени містяться у водному ад'юванті, що містить dl- $\alpha$ -токоферол.

#### Фармацевтична форма

Суспензія.

#### Імунобіологічні властивості

Вакцина забезпечує захист проти захворювань репродуктивної системи, спричинених парвовірусом та лептоспірами серогрупи Pomona серовару Pomona; сприяє зниженню інтенсивності клінічних проявів бешихи та лептоспірозу свиней, спричиненого збудниками сероварів Canicola та Pomona. Забезпечує активну профілактику лептоспірозу свиней, спричиненого збудниками сероварів Canicola, Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Bratislava, Grippotyphosa і Bananal/Liangguang, а також сероварами Tarassovi і Vughia. Вакцинація свиней препаратом Порциліс® Ері+Парво+Лепто знижує виділення лептоспір серовару Canicola у зовнішнє середовище.

Виникнення імунітету проти бешихи свиней спостерігається через 3 тижні, проти парвовірозу – через 10 тижнів та проти лептоспірозу – через 2 тижні після вакцинації. Тривалість імунітету проти бешихи та лептоспірозу, спричиненого збудниками серогрупи Australis складає 6 місяців, проти парвовірозу та лептоспірозу, спричиненого лептоспірами серогруп Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pomona та Tarassovi – 12 місяців.

#### Вид тварин

Свині.

#### Показання

Для активної імунізації свиней проти бешихи, парвовірусної інфекції та лептоспірозу.

#### Протипоказання

Немає.

#### Застереження при застосуванні

Щеплювати лише клінічно здорових тварин. Перед використанням флакони з вакциною ретельно струшують та підігрівають до кімнатної температури (15-25) °С. У разі випадкової ін'єкції препарату людині необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку або етикетку на даний препарат.

#### Взаємодія з іншими засобами

Невідома.

### **Особливі вказівки при вагітності, лактації**

Може застосовуватись під час вагітності і лактації.

### **Спосіб застосування та дози**

Одну дозу (2 мл) вводять шляхом глибокої внутрішньом'язової ін'єкції, у ділянку шиї за вушною раковиною.

### **Програма вакцинації**

Базова вакцинація: свиням, яких раніше не вакцинували препаратом Порциліс® Ері+Парво+Лепто, першу вакцинацію проводять за 6-8 тижнів до запланованої дати осіменіння, другу дозу вакцини (бустер) вводять через 4 тижні після першої вакцинації.

Ревакцинація: ревакцинують 1р. на рік, доповнюючи ревакцинацію щепленням проти бешихи, наприклад, вакциною Порциліс® Ері і т.д., так щоб вакцинація компонентом Ері проводилась через 6 місяців після введення Порциліс® Ері+Парво+Лепто.

### **Побічні ефекти**

Можливе тимчасове підвищення температури тіла на 0,5° С. На місці ін'єкції може виникнути незначна припухлість, що самостійно зникає через декілька днів. Можливі також незначні тимчасові системні реакції, які минають протягом декількох хвилин.

### **Період виведення (каренації)**

Нуль днів.

### **Термін придатності**

24 місяці з дати виготовлення. Вакцину використати впродовж 10-ти годин після розкриття флакона.

### **Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°С до 8°С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

### **Упаковка**

Пластикові флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 20 мл та 50 мл, 100 мл, 250 мл препарату, вторинне упакування – картонні коробки.

### **Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника**

Інтервет Інтернешинл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксmeer, Нідерланди.

### **Правила відпуску**

За рецептом. Застосовувати препарат може лише лікар (фельдшер) ветеринарної медицини.

### **Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.