

Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00165-02-14
від 17.06.2022

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Порциліс® Ері+Парво, Porcilis® Ery+Parvo – вакцина інактивована проти бешихи й парвовірозу свиней.

Склад

Кожна доза вакцини (2 мл) містить:

- антиген *Erysipelothrix rhusiopathiae*, штам M2, серотип 2 >1 PPD (захисна доза 1 свині);
- парвовірус свиней, штам 014, вирощений на тканинній культурі > 552 EU європейських одиниць.

Антигени містяться у водному ад'юванті, що містить dl-α-токоферол.

Фармацевтична форма

Емульсія.

Імунобіологічні властивості

Вакцина індукує вироблення антитіл в організмі імунізованих тварин, що забезпечує захист проти бешихи свиней впродовж не менше 6 міс. та парвовірусної інфекції не менше 12 міс. Антигени вміщені у водний ад'ювант для підсилення стимуляції імунітету.

Вид тварин

Свині.

Показання

Для активної імунізації свиней проти бешихи та парвовірусної інфекції.

Протипоказання

Немає.

Застереження при застосуванні

Щеплювати лише клінічно здорових тварин. Перед використанням флакони з вакциною ретельно струшують та підігрівають до кімнатної температури (15-25) °C. Для вакцинації використовувати лише стерильні шприци та голки. Вакцину використати впродовж 10-ти годин після розкриття флакона. Мити і дезінфікувати руки й обладнання після вакцинації.

Взаємодія з іншими засобами

Не встановлена.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Немає.

Спосіб застосування та дози

Одну дозу (2 мл) вводять шляхом глибокої внутрішньом'язової ін'єкції у ділянку за вушною раковиною.

Програма вакцинації

Захистити тварин проти бешихи та парвовірусної інфекції свиней потрібно до першого парування. Разова вакцинація свиней не пізніше, ніж за 2 тижні до парування є достатньою, щоб захистити послідуочу вагітність від ураження парвовірусом свиней. Для вироблення достатнього захисту проти *Erysipelas*, як базова вакцинацію рекомендують дворазове введення вакцини. Для цього вакцинацію проводять моновалентною вакциною проти бешихи Порциліс® Ері за 4 тижні перед, або 4 тижні після введення комбінованої вакцини Порциліс® Ері+Парво.

Ревакцинація

Ревакцинують двічі на рік у період лактації, за 2-4 тижні до початку парування згідно з альтернативним розкладом вакцинації Porcilis® Ery, Porcilis® Ery+Parvo, Porcilis® Ery і т.д. так щоб вакцинація компонентом Еру проводилася один раз на 6 місяців, а компонентом Parvo один раз на 12 місяців.

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00165-02-14
від 17.06.2022

Побічні ефекти

Можливе тимчасове підвищення температури тіла. На місці ін'єкції може виникнути незначна припухлість, що самостійно зникає через декілька днів.

Період виведення (каренації)

Нуль днів.

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення. Вакцину використати впродовж 10-ти годин після розкриття флакона.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

Упаковка

Скляні (тип II) або ПЕТ флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 20 мл та 50 мл, 100 мл, 250 мл препарату.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

Правила відпуску

Без рецепту. Застосовувати препарат може лише лікар (фельдшер) ветеринарної медицини.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламиацій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.