

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Порциліс[®] PCV, Porcilis[®] PCV - інактивована субодинична вакцина проти цирковірусної інфекції свиней.

Склад

Кожна доза вакцини (2 мл) містить:

Активні діючі компоненти:

протективний антиген ORF2 цирковірусу тип 2 з активністю ≥ 3720 антигенних одиниць (в тесті активності AlphaLISA).

Ад'ювант:

dl- α -токоферолу ацетат 25 мг; мінеральна олія (рідкий парафін) 346 мг.

Фармацевтична форма

Інактивована вакцина у формі водно-олійної емульсії білого кольору.

Імунобіологічні властивості

Вакцина викликає формування імунної відповіді проти цирковірусу свиней тип 2 через 2 тижні після застосування. Імунітет зберігається впродовж всього періоду відгодівлі (6 місяців).

Вид тварин

Свині.

Показання до застосування

Для активної імунізації свиней з метою зменшення навантаження і розповсюдження цирковірусу тип 2 та попередження проявів цирковірусної інфекції і асоційованих з цирковірусом респіраторних захворювань свиней. Результатом вакцинації є збільшення середньодобових приростів свиней впродовж всього періоду відгодівлі, як результат попередження негативного впливу цирковірусу та асоційованих з цирковірусом захворювань.

Протипоказання

Заборонено вакцинувати хворих тварин.

Застереження при застосуванні

Перед використанням флакони з вакциною підігрівають до кімнатної температури (15-25)°C та ретельно струшують. Щеплюють лише клінічно здорових тварин. Використовують стерильні шприци та голки.

Взаємодія з іншими засобами

Немає інформації про безпечність та ефективність одночасного застосування цієї вакцини з іншою. Препарат не можна змішувати з іншими вакцинами та імунобіологічними засобами.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Немає даних.

Спосіб застосування та дози

Одну дозу (2 мл) вводять шляхом внутрішньом'язової ін'єкції, у ділянку шиї за вушною раковиною.

Програма вакцинації:

1. За умови відсутності у поросят колостральних антитіл до цирковірусу тип 2, чи їх низькому рівні, рекомендовано проводити одноразове щеплення поросят, починаючи з 3-тижневого віку.
2. За умови високого рівня колостральних антитіл поросят щеплюють двічі з інтервалом 2-3 тижні, починаючи з 3-5 денного віку.

Побічні ефекти

Після вакцинації можливе короточасне підвищення температури тіла. У незначній кількості тварин можуть спостерігатися поствакцинальні реакції у вигляді пригнічення та зниження апетиту.

У місці ін'єкції може спостерігатися тимчасова місцева реакція у вигляді твердого, іноді теплого набряку, який зникає протягом кількох тижнів.

У дуже рідкісних випадках (менш ніж у 1 тварини на 10 000 тварин) можуть виникати реакції анафілактичного типу, які можуть бути небезпечними для життя. У разі виникнення таких реакцій може знадобитися лікування.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВПІ

При випадковому введенні препарату людині негайно звернутись до лікаря, передавши йому упаковку препарату або листівку-вкладку, та повідомити, що препарат містить мінеральну олію.

Користувачеві:

Цей ветеринарний лікарський засіб містить мінеральну олію. Випадкове введення / самоін'єкція може призвести до сильного болю та набрякості, особливо, якщо його вводять у суглоб або палець, а в рідкісних випадках може призвести до втрати ураженого пальця, якщо негайно не звернутись до лікаря. Якщо ви випадково ввели цей ветеринарний лікарський засіб, негайно зверніться за консультацією до лікаря, при введенні навіть дуже невеликої кількості, візьміть листівку -вкладку з упаковкою з собою. Якщо, після медичного огляду, біль триває більше 12 годин зверніться до лікаря повторно.

Лікарю:

Цей ветеринарний лікарський засіб містить мінеральну олію. Навіть, якщо була, випадкова ін'єкція в дуже невеликій кількості цього продукту,- це може спричинити інтенсивний набряк, що може призвести до, наприклад, ішемічного некрозу і навіть втрати пальця. Потрібна негайна хірургічна допомога, що може потребувати раннього розрізу та зрошення області введення, особливо там, де є ураження пульпи пальця або сухожилля.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПІ, способи його знешкодження і утилізації

Препарат із закінченим терміном придатності та невикористаний утилізують шляхом кип'ятіння протягом 30 хвилин або спалювання.

Термін придатності

36 місяців. Відкритий флакон із вакциною повинен бути використаний протягом 8 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати! Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

Упаковка

Скляний (Type I) або PET флакон, що містить 20, 50, 100, 200 або 500 мл, закупорений галогенобутиловим гумовим корком, запресований алюмінієвим ковпачком з кодом, по 1 або 10 флаконів у коробці.

Правила відпуску

Без рецепту. Застосовувати препарат може лише лікар або фельдшер ветеринарної медицини.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксmeer, Нідерланди.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробників

Інтервет Інтернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксmeer, Нідерланди.

Бургведель Байотек ГмбХ, Ім Ланген Фельде 5 30938, Бургведель, Німеччина.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00059-02-14
від 22.02.2024

рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.