

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Розріджувач для спрею на птицю, Solvent for spray-on-chickens – розріджувач для вакцин Паракокс[®]-5 та Паракокс[®]-8.

Склад

В 1 мл (ml) розріджувача міститься:

Назва речовини	Кількість
<u>Суспензуючий агент:</u> Ксантанова камедь (E415)	12,6 мг
<u>Барвник:</u> Кармін 10 % (E120)	21 мкл
<u>Стабілізатор:</u> Натрію хлорид	4,6 мг
<u>Розріджувач:</u> Вода для ін'єкцій	до 1 мл

Фармацевтична форма

В'язка рідина червоного кольору.

Імунобіологічні властивості

Препарат забезпечує розрідження вакцин перед проведенням вакцинації птиці методом крупно-крапельного спрею.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Препарат застосовується для розрідження вакцин перед проведенням вакцинації птиці методом крупно-крапельного спрею.

Протипоказання

Немає.

Застереження при застосуванні

Препарат не застосовують в разі порушення цілісності закупорки флаконів, наявності механічних домішок і змін кольору. Використовують лише стерильні матеріали та інструменти.

Взаємодія з іншими засобами

Невідома.

Особливі вказівки при несучості

Залежить від особливостей застосування вакцин, які підлягатимуть розрідженню препаратом Розріджувач для спрею на птицю.

Спосіб застосування та дози

Для вакцини Паракокс[®]-5:

Вакцину розпиляють крупно-крапельним спреєм із розрахунку 0,21-0,28 мл розбавленої вакцинної суспензії на одну птицю.

Для вакцини Паракокс[®]-8:

Вакцину розпиляють крупно-крапельним спреєм із розрахунку 0,21 мл розбавленої вакцинної суспензії на одну птицю.

Для отримання більш детальної інформації ознайомтеся з листівками-вкладками на відповідні вакцини.

Побічні ефекти

Немає.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІЗ

Застосування Розріджувача проводять з дотриманням загальноприйнятих правил асептики і антисептики. При випадковій ін'єкції людині вакцини, розрідженої препаратом Розріджувач для спрею на птицю, необхідно звернутися до лікаря гуманної медицини, передавши йому упаковку або листівку-вкладку вакцини.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІЗ, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний або протермінований препарат, упаковку слід знешкоджувати та утилізувати відповідно до вимог чинного законодавства України (автоклавують, кип'ятять, інактивують або спалюють).

Термін придатності

24 місяці.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати у сухому темному приміщенні за температури від 2 °С до 25 °С.

Упаковка

Пластикові флакони (за Європейською Фармакопеєю 3.2.2.) об'ємом 100 або 500 мл (ml), закриті гумовим стопором і алюмінієвим ковпачком.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Интервет Интернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксmeer, Нідерланди.

Назва та місцезнаходження виробників

МСД Енімал Хелс ЮК Лімітед, Уолтон Мейнор, Уолтон, Мілтон Кейнс, Бакінгемшир, МК7 7АДж, Великобританія.

Мерк Шарп енд Дом Енімал Хелс, С.Л. СА, Полігоно Індустріал Ель Монтальво І, С/Цепелін 6, Парсела 38, 37008 Карбахоса-де-ла-Саграда, Саламанка, Іспанія.

Правила відпуску

Без рецепта.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакона цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.