

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нобіліс® МГ 6/85, Nobilis® MG 6/85 – вакцина жива ліофілізована проти мікоплазмозу птиці.

Склад

Кожна доза містить:

живий атенуйований штам MG 6/85 *Mycoplasma gallisepticum*, щонайменше 10^{6,9} КУО.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Використання живої вакцини із *Mycoplasma gallisepticum*, штам MG 6/85 призводить до активної імунізації та до зменшення клінічних проявів інфікування курчат епізоотичними штамми *Mycoplasma gallisepticum*.

Вид тварин

Кури (майбутня несучка).

Показання до застосування

Активна імунізація майбутньої несучки з метою зменшення клінічних проявів мікоплазменної інфекції птиці.

Протипоказання

Не вакцинувати хвору птицю.

Застереження при застосуванні

Вакцинують тільки здорову птицю.

Для розчинення вакцини використовувати чисту, прохолодну воду, що не містить хлору. Для вакцинації шляхом закапування в око використовувати розчинник Oculo Nasal.

Не використовувати живі вакцини проти хвороб респіраторного тракту (ньюкаслської хвороби, бронхіту та ін.) за 14 діб до та 14 діб після щеплення вакциною проти мікоплазмозу. Не застосовувати препарати антимікоплазменної дії за 5 діб до та 14 діб після вакцинації.

Взаємодія з іншими засобами

Застосування антибактеріальних препаратів, особливо антимікоплазменної дії, за 5 діб до та 14 діб після вакцинації значно знижує ефективність вакцинації.

Використання живих вакцин проти хвороб респіраторного тракту (ньюкаслської хвороби, бронхіту та ін.) за 14 діб до та 14 діб після щеплення вакциною проти мікоплазмозу, може призвести до ускладнень або зниження імунітету.

Найважливіші дані щодо безпеки та ефективності, у птиці починаючи з 6-тижневого віку, демонструють, що Nobilis® MG 6/85 можна змішувати та вводити з Nobilis® MS Live.

Перед комбінованим застосуванням слід ознайомитися з листівкою-вкладкою на Nobilis® MS Live.

Немає даних щодо безпечності та ефективності цієї вакцини при застосуванні з будь-якими іншими ветеринарними лікарськими засобами. Тому рішення про використання цієї вакцини до або після будь-яких інших ветеринарних лікарських засобів має прийматися в кожному конкретному випадку.

Особливі вказівки при несучості

Не застосовувати менш ніж за 4 тижні до початку несучості та в період несучості.

Спосіб застосування та дози

Вакцину розчиняють у відповідному об'ємі води або розчинника для досягнення щонайменше 10^{6,9} КУО (1 доза) на птицю методом аерозолі або шляхом закапування в око.

Схема вакцинації

Вакцинують курчат, починаючи з 6-ти тижневого віку.

Після розчинення, вакцину використовують впродовж 2-х годин.

Спрей-метод

Приготування вакцини:

- 1) Вакцину розчиняють у чистій, прохолодній воді, що не містить хлору.
- 2) Флакон занурюють у воду і відкривають під водою.
- 3) Відділяють гумовий ковпачок і стопер від флакона.
- 4) Додають розчинену вакцину у воду для спрею (400 мл на 1000 птиць).
- 5) У випадку комбінованого застосування з вакциною Nobilis® MS Live повторюють етапи 2) і 3), розводячи вміст флакона Nobilis® MS Live того ж дозування, що й Nobilis® MG 6/85 у тій же воді.

Вакцинація

- 1) Вакцину суспензію розпилюють за допомогою аерозольного апарату (розмір крапель повинен бути не більше 20 мікрон).
- 2) Вакцинатор не повинен містити залишки дезінфектантів або знежиреного молока.
- 3) Використовуйте спреєр тільки для вакцинації. Після вакцинації спреєр потрібно добре промити.
- 4) Під час вакцинації закрийте повітропроводи та відключіть вентиляцію.
- 5) Слідуйте вказівкам щодо кількості води.

Закрапування в око

Приготування вакцини:

- 1) Відкривають флакони з вакциною і розчинником Oculo Nasal.
- 2) Сполучають флакони за допомогою конектора.
- 3) Збовтують обидва сполучені флакони до повного розчинення вакцини.
- 4) У випадку комбінованого застосування з вакциною Nobilis® MS Live, повторюють етапи 2) і 3), розводячи вміст флакона Nobilis® MS Live того ж дозування, що й Nobilis® MG 6/85 в тому ж розчиннику.
- 5) Відокремлюють менший флакон, переливають вміст у пластиковий флакон та приєднують піпетку для закрапування.

Вакцинація

- 1) Внесіть одну краплю в око кожній птиці.
- 2) Тримайте флакон з розчищеною вакциною перевернутим вертикально, щоб забезпечити постійний однаковий об'єм краплі.

Побічні ефекти

У здорової птиці системних клінічних реакцій на вакцинацію не спостерігається.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Запобігайте контакту із очима та шкірою. Використовуйте захисні окуляри та маски.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат, упаковку слід утилізувати відповідно до діючого законодавства України (кип'ятять або спалюють).

Термін придатності

24 місяці. Відкритий флакон використати протягом 2 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

Упаковка

Скляні флакони з гідролітичного типу I закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 500, 1000 та 2000 доз ліофілізованої вакцини.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Интервет Интернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, 5831 АН Боксmeer, Нідерланди.

Правила відпуску

Без рецепту. Застосовувати препарат може лише лікар (фельдшер) ветеринарної медицини.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.